

Protocolo: el círculo del pánico en sesión

Guía de 10-15 minutos para explicar el modelo de Clark

Objetivo: que el paciente entienda su propia crisis a través del modelo cognitivo, usando un episodio real propio en lugar de un ejemplo genérico.

SECUENCIA SUGERIDA

1. Pedir un episodio reciente (2-3 min)

"Contame la última vez que tuviste una crisis: dónde estabas, qué fue lo primero que notaste en tu cuerpo."

2. Identificar la sensación inicial (2 min)

Aislar la sensación física específica que disparó todo (ej. taquicardia leve al subir una escalera).

3. Identificar la interpretación catastrófica (2-3 min)

"¿Qué pensaste en ese momento sobre lo que esa sensación significaba?"

4. Dibujar el círculo con su propio ejemplo (3-4 min)

Usar el diagrama de la ficha #3, completando cada nodo con las palabras textuales del paciente.

5. Psicoeducar sobre hiperventilación (2-3 min)

Apoyarse en la ficha #5 para explicar por qué los síntomas son intensos pero no peligrosos.

■ Clave clínica

El objetivo de esta sesión es preparar el terreno para la exposición interoceptiva o situacional posterior. Sin esta comprensión previa, la exposición suele generar más resistencia del paciente.