

Criterios diagnósticos — Trastorno Depresivo Mayor

DSM-5 (APA, 2013) y CIE-11 (OMS, 2019) — consulta rápida

CRITERIO A — SÍNTOMAS (DSM-5)

Al menos 5 de los 9 síntomas presentes durante el mismo período de 2 semanas, representando un cambio respecto al funcionamiento previo. Al menos uno debe ser (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés/placer.

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días.
2. Disminución marcada del interés o placer en casi todas las actividades.
3. Pérdida o aumento significativo de peso / apetito sin hacer dieta.
4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días.
5. Agitación o entecimiento psicomotor observable por otros.
6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.
7. Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva/inapropiada.
8. Dificultad para concentrarse o tomar decisiones.
9. Pensamientos recurrentes de muerte, ideación o intento suicida.

CRITERIOS B, C Y D

- B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral u otras áreas importantes.
- C. El episodio no se atribuye a efectos de una sustancia ni a otra condición médica.
- D. No se explica mejor por otro trastorno (esquizoafectivo, esquizofrenia, etc.). No ha habido episodio maníaco o hipomaníaco.

CIE-11 — EPISODIO DEPRESIVO

Estado de ánimo deprimido o disminución del interés, presente la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos 2 semanas, acompañado de otros síntomas cognitivos, conductuales o neurovegetativos que afectan significativamente el funcionamiento personal, familiar, social, educativo u ocupacional.

■ Clave clínica

El criterio de 2 semanas es un piso, no un techo: la persistencia >2 años con síntomas más leves orienta a distimia, no a TDM. Diferenciar siempre de duelo no complicado y de síntomas atribuibles a condición médica o sustancias.