

Protocolo breve: tristeza vs. depresión

Guía de 10-15 minutos para usar en sesión

Objetivo: ayudar al paciente a ubicar su propia experiencia en el espectro tristeza-depresión, usando sus propias palabras, sin imponer una etiqueta.

SECUENCIA SUGERIDA

1. Abrir sin etiquetar (2 min)

“Contame un poco cómo estuviste estos días, en tus palabras.” Dejar que el paciente describa libremente antes de introducir cualquier marco diagnóstico.

2. Explorar duración e intensidad (3 min)

“¿Hace cuánto te sentís así? ¿Hay momentos del día o situaciones donde se alivia un poco?” Esto orienta si se trata de un estado más transitorio o más sostenido.

3. Psicoeducar con la comparación (3-4 min)

Presentar la diferencia tristeza/depresión (ficha de psicoeducación #7) y preguntar: “¿Con cuál de estas columnas te identificás más en este momento?”

4. Validar sin alarmar (2 min)

Independientemente de la respuesta, validar: “Lo que sea que esté pasando, tiene sentido que te cueste, y estamos para trabajarlo juntos.”

5. Acordar próximo paso (2-3 min)

Si el cuadro orienta a depresión: introducir PHQ-9 o continuar evaluación. Si orienta a tristeza reactiva: explorar el evento desencadenante y recursos de afrontamiento.

■ Clave clínica

Si durante la exploración aparecen señales de alarma (anhedonia extrema, ideación, aislamiento severo), pausar el protocolo psicoeducativo y pasar directamente a cribado de riesgo (ver ficha #20).