

Estrategias para trabajar la vergüenza

Intervenciones desde TCC y ACT · Uso clínico en sesión

DESDE TCC: REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA

Ante un pensamiento de vergüenza, guiar a la paciente por estas preguntas:

- ¿Estoy evaluando lo que hice o lo que soy como persona?
- ¿Hay evidencia real de que soy defectuosa, o cometí un error concreto?
- ¿Le diría a alguien que quiero que es 'fundamentalmente inadecuada' por esto?
- ¿Cuánto de esto viene de mensajes que recibí de otros, no de la realidad?
- ¿Qué diría mi parte más compasiva sobre esto?
- Si alguien que me quiere supiera esto, ¿cambiaría lo que piensa de mí?

DESDE ACT: DEFUSIÓN, VALORES Y AUTOCOMPASIÓN

Defusión cognitiva

Notar el pensamiento como pensamiento, no como verdad. 'Estoy teniendo el pensamiento de que soy defectuosa', en lugar de 'Soy defectuosa'. La vergüenza no es un hecho: es una historia.

Exposición con valores

¿Qué evito por vergüenza que en realidad importa para mi vida? Actuar desde los valores aunque la vergüenza esté presente. La acción no espera que la emoción desaparezca.

Autocompasión

Tratar el propio sufrimiento con la misma calidez que le daríamos a alguien que queremos. La vergüenza se mantiene en el aislamiento; la autocompasión la interrumpe.

Explorar el origen

¿De dónde aprendí que esto de mí era inaceptable? ¿Quién me enseñó a avergonzarme de esto? Identificar el origen no justifica: contextualiza.

ORIENTACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN	INTERVENCIÓN SUGERIDA
Vergüenza por algo concreto	Reestructuración + evaluar si hay algo para reparar
Vergüenza crónica / identitaria	Valores + autocompasión + historia vincular
Vergüenza ligada a trauma	Abordaje lento, foco en seguridad primero
Vergüenza por desear algo	Explorar mensaje de origen + defusión cognitiva

El objetivo no es eliminar la vergüenza. Es que deje de definir quién es la paciente y de gobernar lo que puede o no puede hacer en su vida.