

En el tratamiento de los TCA es útil aprender a identificar los pensamientos automáticos que mantienen el trastorno —y a responderles desde otro lugar. No se trata de "pensar positivo": se trata de crear distancia entre el pensamiento y la acción, y de responder con lo que vos sabés cuando no estás en el momento de máxima ansiedad.

Ejemplos frecuentes

Pensamiento del TCA	Distorsión que contiene	Respuesta posible
"Si como eso, lo voy a arruinar todo"	Pensamiento todo-o-nada; catastrofización.	Comer un alimento no define ni arruina nada. No existe "arruinar".
"No merezco comer"	Creencia nuclear de indignidad.	Todas las personas necesitan y merecen comer, sin condiciones.
"Si no hago ejercicio hoy, soy un fracaso"	Pensamiento todo-o-nada; condicionamiento del valor propio.	Descansar es parte del cuidado, no una falla.
"El atracón demuestra que no tengo control"	Generalización; confunde un comportamiento con una identidad.	Un episodio no define quién soy. Es una señal de que algo me duele.

Tu registro — Fecha: _____

Situación	Pensamiento del TCA	Emoción	Tu respuesta

1. ¿Qué tan difícil fue responder hoy? (1–10) ¿Qué lo hizo difícil?

■ La respuesta no tiene que convencerte en el momento — al principio alcanza con escribirla. La voz del TCA suele ser más intensa cuando estás cansada/o, bajo estrés o en situaciones sociales. Con el tiempo y el tratamiento, pierde fuerza.