

Depresión

ACT — Ficha clínica

DESCRIPCIÓN DEL TRASTORNO

Desde ACT, la depresión se conceptualiza como el resultado de una rigidez psicológica sostenida: fusión con narrativas negativas sobre uno mismo, evitación de experiencias emocionales dolorosas y desconexión progresiva de los valores. A diferencia de la TCC, ACT no busca cambiar el contenido de los pensamientos negativos sino modificar la **relación funcional** del paciente con esos pensamientos.

INTERVENCIONES ACT — PASO A PASO

1	Psicoeducación ACT para depresión Explorar qué ha hecho el paciente para 'salir' de la depresión y qué costo ha tenido (aislamiento, evitación de actividades). Presentar la alternativa: no luchar contra las emociones sino aprender a moverse con ellas.
2	Defusión de la narrativa depresiva Las historias ('no valgo nada', 'todo es inútil') son pensamientos, no hechos. Técnicas: nombrar la historia ('ahí viene la historia de que soy un fracaso'), agradecer a la mente, 'dejar pasar' el pensamiento.
3	Aceptación de emociones dolorosas Trabajar la evitación experiencial: identificar qué emociones evita el paciente y cómo lo hace (distrarse, aislarse, sustancias). Ejercicios: hacer espacio a la tristeza sin intentar eliminarla.
4	Contacto con el momento presente Ejercicios de mindfulness adaptados: notar sensaciones, pensamientos, emociones sin engancharse. Especialmente útil para la rumiación — que el paciente note que está rumiando como primer paso.
5	Clarificación de valores en contexto depresivo La depresión borra el acceso a los valores. Preguntar: '¿Qué era importante para vos antes de la depresión?' ¿Qué tipo de persona quiere ser?
6	Activación desde los valores (no desde el estado de ánimo) Diferencia clave con TCC: no activar para sentirse mejor sino actuar de acuerdo con los valores independientemente del estado de ánimo. 'Actuar aunque la depresión diga que no.'
7	Trabajo con el yo-contexto Ejercicio del yo-observador para separar al paciente de su historia depresiva. 'Hay una parte de vos que ha observado toda esta depresión — ¿quién es ese observador?' Útil con pacientes muy identificados con ser 'depresivos'.

ADAPTACIONES POR POBLACIÓN

Población	Adaptaciones y consideraciones
Adultos	ACT es especialmente útil en depresión con alta rumiación y en pacientes que han tenido múltiples episodios. También en depresión vinculada a pérdida de rol o de identidad.

Depresión

ACT — Ficha clínica

Población	Adaptaciones y consideraciones
Adolescentes	Adaptar el lenguaje de valores — los adolescentes piensan más en términos de relaciones e identidad que de áreas de vida. Metáforas visuales y concretas.
Adultos mayores	Trabajar valores vinculados a legado, relaciones, contribución. El contacto con el momento presente puede ser particularmente poderoso. Atención a duelos y pérdidas acumuladas.

Clave clínica: ACT no busca que el paciente se sienta mejor para actuar — busca que actúe de acuerdo a sus valores aunque se sienta mal. El estado de ánimo es consecuencia, no condición previa.