

Barreras para la accion comprometida

Identificar y trabajar los obstaculos que impiden actuar desde los valores.

PARA QUE SIRVE

Cuando el paciente define una accion comprometida pero no la cumple, hay barreras. Este registro permite identificar sistematicamente las barreras internas (pensamientos, emociones, reglas verbales) y vincularlas con las herramientas ACT correspondientes.

COMO USARLO EN SESION

- 1 Elegir una accion comprometida que el paciente acordo pero no cumplio.
- 2 Preguntar con curiosidad, sin juicio: Que paso cuando intentaste hacerlo? Que aparecio?
- 3 Categorizar: eso que aparecio era externo (no habia tiempo, surgio algo) o interno (pensaste algo, sentiste algo)?
- 4 Para cada barrera interna: ese pensamiento o emocion tomo el volante? Que te dijo?
- 5 Vincular con herramientas: podemos practicar ahora como responder a eso cuando aparezca?
- 6 Reedisennar el plan incorporando el manejo de esa barrera.

BARRERAS INTERNAS MAS FRECUENTES

Fusion con 'no puedo': usar Defusion cognitiva — etiquetado, hojas en el rio

Miedo a sentir algo dificil: usar Aceptacion — abrir espacio a la emocion

La regla de sentirse bien antes de actuar: usar Autobus de los pasajeros — accion comprometida

Autocritica paralizante: usar Defusion cognitiva + yo observador

COMO DECIRLO

"No te pregunto por que no lo hiciste. Te pregunto que paso dentro tuyo cuando intentaste hacerlo."

Para enmarcar la exploracion desde la curiosidad y no desde el reproche

"Esa barrera va a volver a aparecer. Que podes hacer la proxima vez cuando aparezca?"

Para convertir la barrera en un plan de respuesta concreto

ERROR FRECUENTE

Tratar las barreras como excusas

El terapeuta comunica implícitamente que el paciente se está escapando. Eso rompe la alianza.

Como corregirlo: Las barreras son información clínica valiosa. Son la oportunidad de trabajar defusión y aceptación en vivo. Recibirlas con curiosidad.