

Prácticas formales e informales para las seis facetas del hexaflex

MINDFULNESS EN ACT VS. MBCT

En MBCT/TCC el mindfulness reduce la rumiación y previene recaídas depresivas. En ACT, el mindfulness es el vehículo para cultivar las seis facetas del hexaflex: aceptación, defusión, contacto con el presente, yo observador, valores y acción comprometida. No es un fin en sí mismo: es el medio para aumentar la flexibilidad psicológica.

EJERCICIOS FORMALES CON PROPÓSITO CLÍNICO ESPECÍFICO

Hojas en el río (defusión)

El paciente visualiza sus pensamientos como hojas flotando en un río. Cada vez que aparece un pensamiento, lo pone en una hoja y la deja ir. Trabaja la defusión cognitiva sin combatir los pensamientos.

→ Facetas: Defusión cognitiva · Yo como proceso

Escáner corporal de aceptación

Recorrer el cuerpo zona a zona, detenerse en las tensiones o sensaciones difíciles y, en lugar de intentar cambiarlas, practicar hacer espacio y respirar hacia ellas. Trabaja aceptación experiencial.

→ Facetas: Aceptación · Contacto con el presente

El observador — ejercicio de perspectiva

"Notá un pensamiento. Notá quién lo nota. Notá que el que nota no es el pensamiento." Guiar al paciente a encontrar la perspectiva del observador desde la experiencia directa.

→ Facetas: Yo como contexto · Defusión

Mindfulness de los valores

Visualización: "Imaginá que estás al final de tu vida. ¿Qué tipo de persona querías haber sido? ¿Qué querías haber hecho?" Conectar emocionalmente con los valores.

→ Facetas: Clarificación de valores · Contacto con el presente

Respiración-ancla con intención

Tres respiraciones + pregunta: "¿Qué es lo que importa hacer ahora mismo?" Conectar el momento presente con la acción comprometida.

→ Facetas: Contacto con el presente · Acción comprometida

CONSIDERACIONES CLÍNICAS

Lo que potencia la práctica

- Brevedad al inicio: 3-5 minutos en sesión
- Procesar la experiencia después del ejercicio
- Vincular explícitamente con la faceta ACT que trabaja
- Práctica entre sesiones: diario, breve

Precauciones

- Trauma sin estabilizar: el escáner corporal puede activar
- No forzar en primeras sesiones
- Psicosis activa: contraindicado
- El terapeuta practica lo que enseña