

Perspectiva trascendente del self: más allá del yo conceptualizado

QUÉ ES

El "Yo como contexto" o perspectiva del observador es la parte del self que observa pensamientos, emociones y sensaciones sin ser definida por ellos. En ACT se distingue del "yo conceptualizado" (la narrativa que tenemos sobre quiénes somos). El observador es el contenedor: siempre está ahí, no puede ser dañado por el contenido.

LOS TRES NIVELES DEL SELF EN ACT

YO CONCEPTUALIZADO

- La historia que me cuento sobre mí
- "Soy ansioso/a", "soy un fracaso"
- Rígido e identificado con el contenido
- Fuente de mucho sufrimiento en ACT

YO COMO PROCESO

- Conciencia continua del momento presente
- "Noto que estoy pensando..."
- Más flexible que el yo conceptualizado
- Puente hacia el yo como contexto

YO COMO CONTEXTO

- El observador puro, siempre presente
- No cambia con los contenidos mentales
- No puede ser dañado por pensamientos
- Fuente de seguridad y perspectiva

EJERCICIO DEL OBSERVADOR: EL CIELO Y LAS NUBES

"Sos el cielo. Los pensamientos, emociones y sensaciones son las nubes que pasan. Las nubes pueden ser oscuras y tormentosas, o livianas y blancas. Pero el cielo nunca se convierte en las nubes. Siempre está ahí, detrás de ellas."

EJERCICIO FORMAL: "YO NOTO"

Paso 1

Pedir al paciente que cierre los ojos y note un pensamiento presente. Cualquiera.

Paso 2

Decir internamente: "Yo noto que estoy teniendo el pensamiento de que..."

Paso 3

Preguntar: ¿Quién está notando ese pensamiento? ¿Es el mismo que el pensamiento?

Paso 4

Explorar esa perspectiva que observa: "¿Cómo es estar en ese lugar de observación?"

USOS CLÍNICOS

Indicado en

- Fusión cognitiva intensa con narrativa del yo
- Identidad rígida construida sobre el sufrimiento
- TLP y trastornos de identidad
- Trauma: separar el yo del evento traumático
- Autocrítica destructiva e identificación con el crítico interno

Consideraciones

- No forzar: puede sentirse amenazante para algunos pacientes
- Introducir de forma gradual y con metáforas antes del ejercicio formal
- En psicosis: no recomendado en fases agudas
- El vínculo terapéutico debe estar establecido