

Componentes de la terapia DBT

Estructura del tratamiento dialectico-conductual

QUE ES DBT

La Terapia Dialectico-Conductual (DBT) fue desarrollada por Marsha Linehan para el tratamiento del Trastorno Limite de la Personalidad. Hoy tiene evidencia en conductas suicidas, autolesiones, TCA, depresion cronica y otros cuadros de desregulacion emocional.

LOS 4 COMPONENTES DEL TRATAMIENTO ESTANDAR

Componente 1: Terapia individual

1 sesion semanal de 50-60 min con el terapeuta individual. Foco: jerarquia de objetivos, analisis en cadena, gestion de la alianza terapeutica.

Jerarquia: 1)conductas que amenazan la vida 2)conductas que interfieren la terapia 3)calidad de vida

Componente 2: Grupo de entrenamiento en habilidades

Sesion semanal grupal de 2 horas. Se ensayan y practican los 4 modulos: mindfulness, tolerancia al malestar, regulacion emocional y efectividad interpersonal.

El terapeuta individual NO conduce el grupo

Formato psicoeducativo + practica

Componente 3: Consulta telefonica

Disponibilidad del terapeuta individual entre sesiones para coaching de habilidades en crisis.

No para apoyo emocional general

Para generalizar las habilidades al contexto real

Componente 4: Equipo de consulta DBT

Reunion semanal del equipo terapeutico. Supervision, adherencia al modelo, prevencion del burnout.

DBTsin equipo no es DBT estandar

El equipo cuida al terapeuta para que el terapeuta cuide al paciente

POBLACIONES CON EVIDENCIA

Poblacion	Evidencia
TLP	Primera indicacion. Evidencia nivel A.
Conducta suicida y autolesiones	Reducción significativa en ensayos controlados.
TCA	Adaptaciones especificas con buenos resultados.
Depresion cronica	DBT adaptada con evidencia creciente.
Adolescentes	DBT-A: version adaptada con inclusion de familia.