

Estrés

Guía Psicoeducativa

Lic. Agustina Rey

Psicología Clínica Online

Terapia Cognitivo Conductual · Mindfulness · ACT

quieroterapia.com.ar

01. ¿Qué es el estrés?

El estrés es la respuesta del organismo ante cualquier demanda que percibe como desafiante o amenazante. Es un mecanismo evolutivo diseñado para movilizar recursos y facilitar la adaptación.

El problema no es el estrés en sí mismo, sino cuando la respuesta se activa de forma sostenida sin permitir al sistema nervioso retornar al reposo.

Estrés vs. ansiedad:

Dimensión	Estrés · Ansiedad
Origen	Situación o demanda identificable · Puede no tener causa clara
Resolución	Tiende a resolverse al cesar el estímulo · Puede persistir sin estímulo real
Función	Adaptativa ante desafíos concretos · Anticipatoria ante amenaza percibida

02. Estrés agudo vs. estrés crónico

Dimensión	Estrés agudo · Estrés crónico
Duración	Breve (horas o días) · Prolongado (semanas, meses o años)
Origen	Evento puntual identificable · Acumulación de demandas sostenidas
Efecto	Activador, puede mejorar el rendimiento · Desgasta el sistema inmune y nervioso
Recuperación	El cuerpo vuelve al equilibrio solo · Requiere intervención activa

Consecuencias documentadas del estrés crónico:

- Alteraciones del sueño y fatiga crónica
- Problemas digestivos y cardiovasculares
- Disminución de la función inmunológica
- Mayor vulnerabilidad a infecciones
- Irritabilidad, impaciencia y dificultad de concentración
- Ansiedad, tristeza o sensación de vacío

03. Presentación clínica

Síntomas físicos: tensión muscular (cuello, espalda, mandíbula), cefaleas, alteraciones digestivas, fatiga, insomnio, palpitaciones.

Síntomas cognitivos: dificultad para concentrarse, pensamientos acelerados o en bucle, saturación mental, pensamiento catastrófico.

Síntomas emocionales: irritabilidad, sensación de desbordamiento, ansiedad, tristeza o apatía.

Síntomas conductuales: procrastinación, cambios en el apetito, aumento del consumo de sustancias, aislamiento, descuido del autocuidado.

04. El ciclo del estrés sostenido

Cuando el estrés no se resuelve, tiende a retroalimentarse:

- Demanda o estímulo estresante (real o percibido)
- Activación del sistema nervioso simpático: alerta, tensión, aceleración
- Respuesta cognitiva: pensamientos anticipatorios, rumiación
- Conductas de afrontamiento disfuncional: evitación, hiperactividad, aislamiento
- Agotamiento progresivo: el sistema no recupera equilibrio
- Nueva demanda percibida con más intensidad porque los recursos están agotados

Para interrumpir el ciclo:

- Reconocer y nombrar el estrés sin minimizarlo ni catastrofizarlo
- Identificar las fuentes concretas y evaluar cuáles son modificables
- Incorporar actividades de descarga fisiológica (movimiento, respiración)
- Revisar exigencias propias y límites en el entorno

05. Técnicas de regulación

Regulación corporal:

- Respiración diafragmática: inhalar 4 seg · retener 2 · exhalar 6. Repetir 8 veces.
- Relajación muscular progresiva: tensar y soltar grupos musculares de pies a cabeza.
- Movimiento físico moderado: al menos 30 minutos, 3 veces por semana.

Regulación cognitiva:

- Registro escrito de preocupaciones: externalizar los pensamientos los hace más manejables.
- Diferenciar lo controlable de lo incontrolable: dirigir la energía hacia lo primero.
- Tiempo de preocupación acotado: 20 minutos diarios para pensar en problemas.

Regulación relacional:

- Co-regulación con personas de confianza
- Ajuste de expectativas compartidas en el entorno laboral o familiar

06. Hábitos que sostienen el cambio

Hábito	Fundamento
Sueño regulado (7-9 h)	Principal mecanismo de recuperación del sistema nervioso.
Límites claros	La sobreexigencia sostenida es un factor de riesgo para el burnout.
Descanso activo	Las actividades placenteras y significativas restauran más que la inactividad.
Reducción de cafeína, azúcar y alcohol	Estas sustancias amplifican la activación fisiológica del estrés.
Conexión social	El aislamiento amplifica el estrés; los vínculos funcionan como amortiguadores.
Reducción de estimulación digital	La exposición a pantallas antes de dormir interfiere con la recuperación.