

Trastorno de Ansiedad Generalizada

Guía Psicoeducativa

Lic. Agustina Rey

Psicología Clínica Online

Terapia Cognitivo Conductual · Mindfulness · ACT

quieroterapia.com.ar

01. ¿Qué es el TAG?

El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) se caracteriza por una preocupación excesiva, persistente y difícil de controlar sobre múltiples áreas de la vida cotidiana. A diferencia de la ansiedad situacional, la preocupación en el TAG no está circunscripta a un tema o evento: se desplaza de un área a otra de forma casi continua.

La persona reconoce frecuentemente que se preocupa más de lo que la situación justifica, pero no logra detener el proceso. Este esfuerzo sostenido de control genera agotamiento físico y mental significativo.

Criterios centrales:

- Ansiedad y preocupación excesiva sobre múltiples temas, la mayoría de los días, durante al menos 6 meses
- Dificultad para controlar la preocupación
- Al menos tres síntomas asociados: inquietud, fatiga, dificultad de concentración, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño
- Malestar significativo o deterioro del funcionamiento

02. Áreas de preocupación frecuentes

- Trabajo o rendimiento académico
- Salud propia o de personas cercanas
- Economía y seguridad financiera
- Relaciones interpersonales y vínculos
- Situaciones cotidianas: puntualidad, compromisos, tareas domésticas
- Eventos futuros e impredecibles

Nota clínica: La preocupación en el TAG tiene función: la persona cree (implícitamente) que preocuparse la prepara para lo peor o previene que algo malo ocurra. Esta creencia es un objetivo central del trabajo terapéutico.

03. Presentación clínica

Síntomas cognitivos:

- Pensamiento anticipatorio y catastrófico: "¿Y si...?"
- Dificultad para tolerar la incertidumbre
- Rumiación: repaso repetitivo de los problemas sin llegar a resolución
- Dificultad para concentrarse o sensación de tener la mente en blanco

Síntomas físicos:

- Tensión muscular crónica (cuello, espalda, mandíbula)
- Fatiga persistente no explicada por esfuerzo físico
- Alteraciones del sueño: dificultad para conciliar o mantener el sueño
- Irritabilidad, inquietud, sensación de estar "al límite"
- Síntomas gastrointestinales, cefalea tensional

04. Diagnóstico diferencial

Condición	Distinción clave
Preocupación normal	La preocupación normal es proporcional, acotada en el tiempo y no interfiere en el funcionamiento.

Condición	Distinción clave
Trastorno de pánico	En el pánico el miedo central son las sensaciones físicas y la pérdida de control. En el TAG, la preocupación es cognitiva y sostenida.
Depresión	La rumiación depresiva se orienta al pasado y a la autocrítica. La del TAG se orienta al futuro y a la anticipación de amenazas.
TOC	Las obsesiones del TOC son egodistónicas e intrusivas. Las preocupaciones del TAG se perciben como propias y relacionadas con la vida real.
Ansiedad social	La ansiedad social se limita a situaciones de evaluación social. El TAG abarca múltiples dominios.

05. El papel de la intolerancia a la incertidumbre

La intolerancia a la incertidumbre es el factor transdiagnóstico más consistentemente asociado al TAG. La persona trata la posibilidad de que algo malo ocurra como si fuera una probabilidad alta, y responde con preocupación como estrategia de preparación o control.

Creencia disfuncional	Reformulación clínica
"Si me preocupo, estaré preparada para lo peor"	Preocuparse no reduce la probabilidad de que algo ocurra ni mejora la respuesta cuando ocurre.
"No puedo funcionar sin saber cómo va a salir"	La incertidumbre es inherente a la vida. La tolerancia a ella se puede entrenar.
"Dejar de preocuparme sería irresponsable"	Preocuparse de forma crónica deteriora la capacidad de respuesta, no la mejora.

06. Abordaje clínico

- Psicoeducación sobre el ciclo de la preocupación y el papel de la intolerancia a la incertidumbre
- Técnica de tiempo de preocupación acotado: 20-30 minutos diarios para preocuparse, fuera de ese tiempo posponer activamente
- Exposición a la incertidumbre: reducción progresiva de conductas de búsqueda de seguridad y reaseguro
- Reestructuración cognitiva: evaluación realista de probabilidades y capacidad de afrontamiento
- Técnicas de regulación fisiológica: respiración, relajación muscular progresiva
- Mindfulness: observación de la preocupación sin fusionarse con ella
- Resolución de problemas: diferenciar preocupaciones con solución de las que no la tienen