

Técnica clínica · Culpa

Estrategias para trabajar la culpa

Intervenciones desde TCC y ACT para flexibilizar la culpa disfuncional.

DESDE TCC: REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA

Ante un pensamiento de culpa, guiar al/la paciente por estas preguntas:

- ¿Qué evidencia tengo de que realmente hice algo malo?
- ¿Estoy asumiendo responsabilidad por algo que no dependía de mí?
- ¿Qué hubiera hecho cualquier otra persona razonable en esa situación?
- ¿Ya hice lo que estaba en mis manos para reparar?
- ¿Me juzgo con los mismos estándares con los que juzgaría a alguien que quiero?
- ¿Qué diría mi parte más compasiva sobre esto?

DESDE ACT: DEFUSIÓN Y VALORES

Defusión cognitiva: Notar el pensamiento como pensamiento, no como hecho. 'Estoy teniendo el pensamiento de que soy mala persona', en lugar de 'Soy mala persona'.

Observar la culpa sin actuar desde ella: ¿Qué haría si la culpa no tuviera tanto peso? ¿Esa acción estaría alineada con mis valores?

Clarificación de valores: La culpa genuina apunta a un valor. Preguntar: ¿qué valor tocó esta situación? ¿Cómo puedo honrarlo desde acá?

Autocompasión como valor, no como debilidad: Tratarme con la misma amabilidad que le daría a un amigo que cometió el mismo error.

LA REPARACIÓN: CUÁNDO Y CÓMO

Reparar tiene sentido cuando la culpa es real y proporcional. Pero la reparación tiene que tener un punto de cierre. No se puede pedir perdón para siempre ni castigarse indefinidamente.

¿Corresponde reparar?	Sí	No siempre
La acción dañó a alguien realmente	✓	
El error dependía de vos	✓	
Ya pediste disculpas y cambiaste algo		Suficiente — seguir no ayuda
La culpa viene de expectativas ajenas		Explorar en sesión
Ya te perdonaron pero no podés perdonarte		Trabajo de autocompasión

El objetivo no es eliminar la culpa. Es que la culpa sea proporcional, que lleve a la reparación cuando corresponde, y que no se convierta en una condena permanente.