

Pensamiento Todo o Nada

Pensamiento dicotómico / blanco o negro

01

¿QUÉ ES?

Tendencia a ver las situaciones en categorías extremas, sin términos medios. Si algo no es perfecto, se percibe como un fracaso total.

SEÑALES EN SESIÓN

- Uso frecuente de 'siempre', 'nunca', 'todo', 'nada'.
- Dificultad para ver matices o puntos intermedios.
- Juicios rígidos sobre uno mismo y los demás.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Registro ABC para identificar el pensamiento extremo.
- Escala del 0 al 100: ¿dónde ubicarías esta situación?
- Búsqueda de evidencia que contradiga los extremos.
- Reestructuración hacia lenguaje más flexible y matizado.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento: "Cometí un error en el trabajo. Soy un fracaso total."

Alternativa: Cometí un error. Eso no me define como profesional.

Material de uso clínico · quieroterapia.com.ar

Catastrofización

Magnificación del peligro / adivinar el futuro

02

¿QUÉ ES?

Se anticipa el peor resultado posible ante una situación incierta, tratándolo como probable o inevitable.

SEÑALES EN SESIÓN

- '¿Y si pasa lo peor?' como pensamiento recurrente.
- Alta activación ansiosa frente a situaciones ambiguas.
- Dificultad para tolerar la incertidumbre.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Técnica del 'continuum de probabilidad': ¿qué tan probable es?
- Desensibilización cognitiva: ¿y si pasara, qué harías?
- Registro de predicciones vs. resultados reales.
- Flecha descendente: ¿qué significaría si pasara?

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento: "Si me tiembla la voz en la reunión, todos van a pensar que soy incompetente."

Alternativa: Puedo sentir nervios y aun así dar una buena presentación.

Material de uso clínico · quieroterapia.com.ar

Filtro Mental

Abstracción selectiva

03

¿QUÉ ES?

Se enfoca la atención en un detalle negativo, ignorando el cuadro general. Un solo aspecto negativo tiñe toda la experiencia.

SEÑALES EN SESIÓN

- Foco persistente en lo que salió mal, ignorando lo positivo.
- Recuerdos sesgados hacia experiencias negativas.
- Estado de ánimo bajo sin causa aparente.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Registro de evidencia a favor y en contra.
- Técnica del 'zoom out': ¿qué más ocurrió ese día?
- Diario de logros y aspectos positivos diarios.
- Pregunta socrática: ¿qué le dirías a una amiga en tu lugar?

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento: "Me aplaudieron toda la charla, pero una persona bostezó. Fue un desastre."

Alternativa: Una persona bostezó. La mayoría estuvo atenta y me aplaudió.

Material de uso clínico · quieroterapia.com.ar

Descalificación de lo Positivo

Desestimación de experiencias positivas

04

¿QUÉ ES?

Las experiencias positivas se rechazan o minimizan, mientras que los aspectos negativos se mantienen como más reales o significativos.

SEÑALES EN SESIÓN

- 'Sí, pero...' ante cualquier éxito o logro.
- Atribuir los éxitos a la suerte o a otros.
- Dificultad para recibir halagos o reconocimiento.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Identificar el patrón de minimización activa.
- Registro de logros con evidencia objetiva.
- Explorar creencias nucleares vinculadas a no merecer.
- Experimentos conductuales: recibir el halago y observar qué pasa.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento: "Me felicitaron, pero cualquiera hubiera hecho lo mismo. No es para tanto."

Alternativa: Me esforcé y el resultado fue reconocido. Eso es real.

Material de uso clínico · quieroterapia.com.ar

Lectura del Pensamiento

Inferencia arbitraria sobre otros

05

¿QUÉ ES?

Se asume saber lo que piensan o sienten otras personas, sin evidencia suficiente para sostenerlo.

SEÑALES EN SESIÓN

- 'Sé que está enojado conmigo' sin datos concretos.
- Interpretar silencios, gestos o tonos de forma negativa.
- Conductas de evitación basadas en suposiciones.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Diferenciación entre datos y suposiciones.
- Técnica de la 'evidencia': ¿qué prueba tenés?
- Generación de hipótesis alternativas sobre la conducta del otro.
- Entrenamiento en comunicación asertiva para verificar.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento: "No me respondió el mensaje. Está enojada conmigo, seguro."

Alternativa: No respondió. Puede haber muchas razones. Puedo preguntarle.

Material de uso clínico · quieroterapia.com.ar

Predicción del Futuro

Adivinar / anticipación negativa

06

¿QUÉ ES?

Se anticipa que las cosas van a salir mal, tratando esa predicción como un hecho inevitable.

SEÑALES EN SESIÓN

- Evitación de situaciones por anticipar el fracaso.
- Alta ansiedad anticipatoria.
- Planes truncados por 'sé que no va a funcionar'.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Registro de predicciones y contraste con resultados reales.
- Análisis costo-beneficio de evitar vs. intentar.
- Experimentos conductuales progresivos.
- Análisis histórico: ¿cuántas predicciones negativas se cumplieron?

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento: "Ni me presento a esa entrevista. Sé que no voy a quedar."

Alternativa: No puedo saber el resultado. Presentarme me da más información.

Material de uso clínico · quieroterapia.com.ar

Razonamiento Emocional

Las emociones como evidencia de la realidad

07

¿QUÉ ES?

Se toman las emociones como evidencia de la verdad.
'Siento que soy un fracaso, por lo tanto lo soy.'

SEÑALES EN SESIÓN

- Dificultad para separar sentimiento de hecho.
- Alta reactividad emocional en situaciones ambiguas.
- Uso de 'siento que' como argumento de verdad.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Psicoeducación: las emociones no son hechos.
- Registro ABC: separar emoción de interpretación.
- Identificación del pensamiento que generó la emoción.
- Técnica del detective: ¿qué evidencia real tenés?

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento: "Me siento estúpida, así que debo serlo."

Alternativa: Me siento estúpida en este momento. Ese sentimiento no define mi capacidad.

Material de uso clínico · quieroterapia.com.ar

Afirmaciones 'Debería'

Imperativo moral / reglas rígidas

08

¿QUÉ ES?

Reglas rígidas e inflexibles sobre cómo uno mismo, los demás o la vida deberían ser. Generan culpa, resentimiento y frustración constante.

SEÑALES EN SESIÓN

- Culpa intensa ante el incumplimiento de normas propias.
- Resentimiento cuando otros no cumplen las expectativas.
- Perfeccionismo y autoexigencia elevada.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Identificación de las reglas: ¿de dónde vienen?
- Reformulación de 'debería' a 'me gustaría / preferiría'.
- Análisis del costo de mantener esa regla.
- Trabajo con valores: ¿esto refleja lo que realmente importa?

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento: "Debería poder con todo sin pedir ayuda. Si no puedo, soy débil."

Alternativa: Pedir ayuda es una habilidad, no una debilidad.

Etiquetación

Sobregeneralización identitaria

09

¿QUÉ ES?

Se asigna una etiqueta global y negativa a uno mismo o a otros, basándose en un evento específico.

SEÑALES EN SESIÓN

- 'Soy un fracasado', 'soy un inútil', 'soy mala madre'.
- Identidad construida sobre errores o fallas puntuales.
- Dificultad para separar conducta de identidad.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Separar conducta de identidad: hice algo, no soy algo.
- Registro de evidencia contraria a la etiqueta.
- Técnica del pastel: ¿qué porcentaje real define esa etiqueta?
- Trabajo con creencias nucleares en etapas avanzadas.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento: "Olvidé la reunión. Soy un irresponsable."

Alternativa: Olvidé una reunión. Puedo tomar medidas para que no vuelva a pasar.

Material de uso clínico · quieroterapia.com.ar

Personalización

Atribución interna excesiva

10

¿QUÉ ES?

Tendencia a asumir responsabilidad excesiva por eventos negativos externos, aunque no haya relación directa.

SEÑALES EN SESIÓN

- Culpa intensa ante situaciones que involucran a otros.
- 'Si yo hubiera hecho algo diferente, no habría pasado'.
- Dificultad para identificar factores externos.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Técnica del pastel de responsabilidad: listar todos los factores.
- Análisis realista de control: ¿qué depende de vos?
- Psicoeducación sobre causalidad múltiple.
- Reducción de autocrítica y trabajo con autocompasión.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento: "Mis papás se pelearon. Seguro fue por algo que yo hice."

Alternativa: La relación de mis papás depende de ellos, no de mí.

Material de uso clínico · quieroterapia.com.ar

Generalización Excesiva

Sobregeneralización

11

¿QUÉ ES?

A partir de un solo evento negativo, se concluye un patrón universal y permanente de fracaso.

SEÑALES EN SESIÓN

- 'Siempre me pasa lo mismo', 'nunca me sale bien'.
- Un fracaso puntual se convierte en evidencia de falla total.
- Desmotivación y abandono ante primeros obstáculos.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Análisis de frecuencia real: ¿cuántas veces ocurrió?
- Registro de excepciones: ¿cuándo no fue así?
- Reformulación: 'en esta ocasión' en lugar de 'siempre'.
- Línea de tiempo de logros para contrastar la generalización.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento: "Me rechazaron en esa cita. Siempre me pasa. Nadie me va a querer."

Alternativa: Esta vez no funcionó. No predice lo que pasará siempre.

Material de uso clínico · quieroterapia.com.ar

Magnificación y Minimización

Binoculares / distorsión del tamaño

12

¿QUÉ ES?

Se exageran los aspectos negativos (propios o ajenos) y se minimizan los positivos, o viceversa con los demás.

SEÑALES EN SESIÓN

- 'Para ella todo es fácil, yo soy un desastre'.
- Errores propios vistos como enormes; logros, insignificantes.
- Comparaciones constantes y asimétricas.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Técnica de los binoculares: ¿estás agrandando o achicando?
- Escala de impacto real del evento (0-100).
- Registro doble: ¿cómo lo verías si le pasara a otra persona?
- Trabajo con estándar doble y autocompasión.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento: "Ella habla en público perfecto. Yo tartamudeé una vez, soy un desastre."

Alternativa: Me trabé una vez. No tengo información real sobre cuánto le cuesta a ella.

Material de uso clínico · quieroterapia.com.ar