

ANSIEDAD Y GESTIÓN EMOCIONAL

Recursos clínicos

Ansiedad anticipatoria


Cuando el miedo vive en el futuro

Recurso TCC · quieroterapia.com.ar

La ansiedad anticipatoria aparece antes de que pase algo — muchas veces mucho antes. No es una reacción a algo real: es una reacción a lo que imaginamos que podría pasar. El cerebro no distingue bien entre una amenaza real y una imaginada.

- La preocupación se siente como preparación, pero en realidad agota y bloquea
- Cuanto más evitamos la situación temida, más crece la anticipación

Cómo se instala el ciclo anticipatorio



Mi patrón de anticipación

Una situación que suelo anticipar negativamente:

¿Qué pasó realmente las últimas veces que anticipé así?

Miedo vs. ansiedad

No son lo mismo — aunque se sientan igual

Recurso TCC/psicoeducación · quieroterapia.com.ar

Miedo y ansiedad se parecen mucho en el cuerpo. Pero tienen una diferencia clave: el miedo reacciona a algo real y presente; la ansiedad anticipa algo que podría pasar. Entender cuál estás sintiendo ayuda a elegir la respuesta correcta.

Las diferencias principales

Miedo	Ansiedad
Amenaza real y presente.	Amenaza posible o imaginada.
Respuesta adaptativa: lucha, huida o parálisis.	Orientada al futuro.
Se va cuando el peligro pasa.	Puede persistir aunque no haya peligro real.

¿Cuándo se vuelven un problema?

Cuando la respuesta es desproporcionada al estímulo o interfiere con la vida cotidiana.

La clave terapéutica

Con el miedo: enfrentar. Con la ansiedad: cuestionar la amenaza y reducir la evitación.

Lo que noto en mí

¿Con qué frecuencia siento miedo vs. ansiedad?

¿Qué cambia si reconozco cuál es cuál?

Técnica 5-4-3-2-1

Anclaje sensorial para salir del modo ansiedad

Recurso mindfulness/ansiedad · quieroterapia.com.ar

Cuando la ansiedad se dispara, la mente se va al futuro. Esta técnica usa los sentidos para traerla al presente. Es simple, discreta y se puede hacer en cualquier lugar. Usala cuando notás que la ansiedad sube y querés interrumpir el espiral.

Los 5 pasos — uno por sentido



Mi práctica

¿En qué momentos del día podría practicar esto?

¿Qué tan seguido lo hice esta semana?

Respiración diafragmática

La herramienta de regulación que siempre está disponible

Recurso regulación sistema nervioso · quieroterapia.com.ar

La respiración es uno de los pocos procesos automáticos que también podemos controlar. Respirar lento y profundo activa el sistema nervioso parasimpático — el que frena la respuesta de alarma. Al alargar la espiración, le mandamos al cerebro la señal de que no hay peligro real.

La técnica paso a paso

1

Preparación

Poné una mano en el pecho y otra en el abdomen. El abdomen debe moverse, el pecho no.

2

Inspiración — 4 s

Inhalá por la nariz, lentamente, sintiendo el abdomen expandirse

3

Pausa — 2 s

Retenés el aire brevemente

4

Espiración — 6 s

Exhalás por la boca despacio. La espiración más larga que la inspiración es la clave.

5

Repetir

5 a 10 veces. El efecto se nota a partir del tercer o cuarto ciclo.

Mi práctica esta semana

¿En qué momentos la usé?

¿Qué noté en el cuerpo después de hacerla?


Técnica STOP

Una pausa de 60 segundos para no reaccionar en piloto automático

Recurso mindfulness/DBT · quieroterapia.com.ar

Cuando estamos activados, tendemos a reaccionar de forma automática — muchas veces de maneras que después lamentamos. La técnica STOP crea una pausa intencional entre el estímulo y la respuesta. Se puede hacer en cualquier lugar, sin que nadie lo note.

Las 4 letras del STOP



Mi práctica

Una situación donde me cuesta hacer pausa antes de reaccionar:

¿Qué letra del STOP me parece más difícil? ¿Por qué?

Surfeo del impulso

Cómo tolerar la urgencia sin actuar desde ella

Recurso DBT · quieroterapia.com.ar

En DBT, el surfeo del impulso es una técnica para tolerar emociones o urgencias intensas sin actuar de forma impulsiva. Se basa en un principio clave: toda ola tiene un pico y luego baja — si no la alimentamos, disminuye sola. La urgencia dura aproximadamente 20-30 minutos si no la reforzamos.

Cómo surfear la ola

1

Reconocé la urgencia

"Estoy sintiendo una urgencia intensa. Esto es una ola, no una orden."

2

Observá sin juzgar

Notá las sensaciones en el cuerpo sin etiquetarlas como buenas o malas

3

Recordá que la ola baja

Aunque ahora se siente insoportable, tiene un pico y luego disminuye sola

4

Elegí una acción alternativa

Caminá, escribí, respirá, llamá a alguien — algo que no refuerce la urgencia

Mi práctica

Una urgencia o impulso que me cuesta manejar:

Una acción alternativa que puedo tener lista:

Regulación emocional

Cómo manejar las emociones sin que nos manejen

Recurso DBT/ACT · quieroterapia.com.ar

Regular las emociones no significa no sentirlas. Significa poder sentirlas sin que determinen completamente lo que hacemos. Las emociones son señales, no órdenes.

Emoción primaria: la que aparece espontánea (miedo, tristeza, enojo)

Emoción secundaria: la que sentimos sobre la emoción ("me da vergüenza tener miedo")

Regulación: tolerar, nombrar y responder — sin actuar impulsivamente

Los 4 pasos para regular una emoción intensa

1

Hacer pausa

Detectar que la emoción está presente. No actuar todavía.

2

Nombrarla

"Estoy sintiendo ansiedad / enojo / tristeza" — ponerle nombre la desactiva

3

Ubicarla en el cuerpo

¿Dónde la sentís? Pecho, garganta, estómago, mandíbula...

4

Elegir la respuesta

Respirar, alejarse, hablar, escribir — actuar desde los valores, no desde el impulso

Mi práctica esta semana

Una emoción que me cuesta regular:

Una respuesta alternativa que podría probar:

Registro de situaciones ansiosas

Tarea para entre sesiones — semana del ____/____

Tarea TCC · quieroterapia.com.ar

Completá este registro cuando notes que tu ansiedad sube. No hace falta que sea una situación intensa — cualquier momento de incomodidad sirve. Cuanto más registrás, más patrones podemos identificar juntos/as.

Situación / disparador	Pensamiento automático	Emoción (0-10)	Conducta / respuesta

Diario de preocupaciones

Tarea para entre sesiones — semana del ____/____

Tarea TCC · quieroterapia.com.ar

La preocupación constante agota porque ocurre de forma desorganizada todo el día. El diario de preocupaciones crea un momento contenido para preocuparte — y te ayuda a posponer las preocupaciones fuera de ese momento.

Instrucción: Anotá cada preocupación cuando aparezca. Al final del día revisá cuáles siguen siendo válidas.

Preocupación	¿Controlable?	¿Qué puedo hacer?	¿Pasó al día siguiente?

Escalera de exposición gradual

Construimos juntos/as el camino hacia lo que evitás

Tarea TCC/Exposición · quieroterapia.com.ar

La exposición gradual es la técnica más efectiva para reducir la ansiedad a largo plazo. Consiste en enfrentar la situación temida de forma progresiva — de menor a mayor dificultad — dándole al cerebro la oportunidad de aprender que no hay peligro real.

Situación que quiero trabajar:

Paso 1 — El más fácil

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6 — El más difícil

Paso completado	Ansiedad esperada (0-10)	Ansiedad real (0-10)	Fecha / resultado

Mapa corporal de la ansiedad

¿Dónde la sentís en el cuerpo?

Recurso conciencia corporal · quieroterapia.com.ar

La ansiedad siempre tiene una huella en el cuerpo. Aprender a reconocerla es el primer paso para regularla. Marcá en cada zona qué síntomas reconocés en vos.

Síntomas frecuentes por zona

Cabeza / mente

- Pensamientos acelerados
- Dificultad para concentrarse
- Sensación de irrealidad

Corazón / pecho

- Palpitaciones o taquicardia
- Opresión o presión en el pecho
- Sensación de falta de aire

Garganta

- Nudo en la garganta
- Dificultad para tragar
- Voz entrecortada

Estómago

- Náuseas o mariposas
- Tensión o dolor abdominal
- Ganas de ir al baño

Músculos

- Tensión en hombros y cuello
- Mandíbula apretada
- Piernas flojas o tensas

General

- Sudoración
- Manos frías o temblorosas
- Inquietud o necesidad de moverse

¿Cuáles reconocés en vos? Marcalos

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Pensamientos acelerados | ☐ Dificultad para concentrarse | ☐ Sensación de irrealidad |
| ☐ Palpitaciones o taquicardia | ☐ Opresión o presión en el pecho | ☐ Sensación de falta de aire |
| ☐ Nudo en la garganta | ☐ Dificultad para tragar | ☐ Voz entrecortada |
| ☐ Náuseas o mariposas | ☐ Tensión o dolor abdominal | ☐ Ganas de ir al baño |
| ☐ Tensión en hombros y cuello | ☐ Mandíbula apretada | ☐ Piernas flojas o tensas |
| ☐ Sudoración | ☐ Manos frías o temblorosas | ☐ Inquietud o necesidad de moverse |

¿Qué parte del cuerpo notás primero cuando te ponés ansioso/a?

Recurso conciencia emocional · quieroterapia.com.ar

Del centro hacia afuera: emoción base → más específica → más precisa

¿Qué emoción estás sintiendo ahora mismo? ¿Podés ir hacia afuera en la rueda?