

8 Técnicas para trabajar la Ansiedad

Lo que uso con mis pacientes en sesión

AUTOMONITOREO

Registro de Situaciones Ansiógenas

PARA QUÉ SIRVE

Mapear los disparadores específicos y romper la automaticidad de la ansiedad.

CUÁNDO LA USO

- Al inicio del tratamiento
- Cuando el paciente no identifica sus disparadores
- Como tarea entre sesiones

PASO A PASO

- 1 Describir la situación: ¿dónde, cuándo, con quién?
- 2 Nivel de ansiedad del 0 al 10
- 3 Pensamiento automático que apareció
- 4 Síntomas físicos
- 5 Conducta: ¿qué hizo o evitó?

REGULACIÓN FISIOLÓGICA

Respiración Diafragmática

PARA QUÉ SIRVE

Activar el sistema parasimpático y romper el ciclo ansiedad → hiperventilación → más ansiedad.

CUÁNDO LA USO

- En crisis de ansiedad o pánico
- Como práctica preventiva diaria
- Antes de situaciones disparadoras

PASO A PASO

- 1 Mano en pecho, mano en abdomen. Solo debe moverse el abdomen.
- 2 Inspirar por nariz contando 4 tiempos.
- 3 Sostener 2 tiempos.
- 4 Exhalar por boca contando 6 tiempos.
- 5 Repetir 5 a 10 ciclos. Practicar 2 veces por día.

TÉCNICA COGNITIVA

Reestructuración del Pensamiento Catastrófico

PARA QUÉ SIRVE

Reemplazar predicciones catastrofistas por evaluaciones basadas en evidencia real.

CUÁNDO LA USO

- Cuando anticipa el peor resultado como inevitable
- En ansiedad generalizada y fobia social
- Con registro ABC consolidado como base

PASO A PASO

- 1 Identificar el pensamiento catastrófico.
- 2 Evaluar probabilidad real del 0 al 100.
- 3 Buscar evidencia a favor y en contra.
- 4 Generar un pensamiento alternativo realista.
- 5 Evaluar cómo cambia la ansiedad.

TÉCNICA CONDUCTUAL — PRIMERA LÍNEA

Exposición Gradual

PARA QUÉ SIRVE

Romper el ciclo de evitación que mantiene y amplifica la ansiedad.

CUÁNDO LA USO

- En fobias, ansiedad social, agorafobia
- Cuando la evitación mantiene el problema
- Después de psicoeducación y regulación

PASO A PASO

- 1 Construir jerarquía: listar situaciones de menor a mayor ansiedad.
- 2 Asignar valor del 0 al 100 (SUDS).
- 3 Comenzar por situaciones de valor 20-30.
- 4 Mantenerse hasta que la ansiedad baje al menos 50%.
- 5 Registrar nivel de ansiedad antes, durante y después.

ANCLAJE SENSORIAL

Grounding 5-4-3-2-1

PARA QUÉ SIRVE

Interrumpir la espiral ansiosa y devolver al paciente al momento presente.

CUÁNDO LA USO

- En crisis de ansiedad o pánico agudo
- Cuando hay sensación de irrealidad
- Como primer paso antes de técnicas cognitivas

PASO A PASO

- 1 5 cosas que podés VER ahora mismo.
- 2 4 cosas que podés TOCAR. Hacerlo físicamente.
- 3 3 cosas que podés OÍR en este momento.
- 4 2 cosas que podés OLER.
- 5 1 cosa que podés SABOREAR.

AUTOMONITOREO CONDUCTUAL

Registro de Evitaciones

PARA QUÉ SIRVE

Hacer visible el patrón de evitación y su costo real en la vida del paciente.

CUÁNDO LA USO

- Cuando el paciente minimiza el impacto de la ansiedad
- Como paso previo a la exposición gradual
- En ansiedad social y agorafobia

PASO A PASO

- 1 Registrar durante una semana todo lo que evitó.
- 2 Clasificar: situación, persona, pensamiento o sensación.
- 3 Registrar el alivio a corto plazo.
- 4 Registrar el costo a mediano plazo.
- 5 Pregunta clave: ¿qué vida tendría si no evitara esto?

REGULACIÓN SOMÁTICA

Relajación Muscular Progresiva

PARA QUÉ SIRVE

Reducir la tensión muscular crónica y bajar el nivel basal de activación.

CUÁNDO LA USO

- En ansiedad generalizada con tensión persistente
- Como práctica preventiva diaria
- Complementaria a la respiración diafragmática

PASO A PASO

- 1 Posición cómoda, ojos cerrados.
- 2 Comenzar por los pies: tensar 5 seg, soltar.
- 3 Subir: pantorrillas, muslos, abdomen, manos, brazos, hombros, cara.
- 4 En cada grupo: tensión → soltar → observar la diferencia.
- 5 Finalizar con respiración lenta y escaneo corporal.

PROTOCOLO PERSONALIZADO

Plan de Acción ante Crisis

PARA QUÉ SIRVE

Dar al paciente una guía clara para crisis. Saber qué hacer reduce la intensidad.

CUÁNDO LA USO

- Con cualquier paciente que tenga crisis de ansiedad
- Se construye en sesión y se entrega por escrito
- Se revisa y ajusta con la experiencia del paciente

PASO A PASO

- 1 RECONOCER: 'Esto es ansiedad. No es peligroso. Va a pasar.'
- 2 PARAR: no huir de la situación si es posible.
- 3 RESPIRAR: inspirar 4, sostener 2, exhalar 6.
- 4 ANCLAR: aplicar grounding 5-4-3-2-1.
- 5 EVALUAR: cuando baja la activación, registrar el disparador.