

Protocolo completo: relajación, jerarquía e imaginación

QUÉ ES

La desensibilización sistemática (Wolpe, 1958) combina el entrenamiento en relajación muscular con la exposición gradual imaginada. Se basa en el principio de inhibición recíproca: la relajación profunda es incompatible con la ansiedad. Es particularmente útil en fobias específicas y cuando la exposición in vivo no es posible.

PROTOCOLO: TRES FASES

Fase 1 — Entrenamiento en relajación

- Enseñar relajación muscular progresiva (Jacobson) o respiración diafragmática profunda
- El paciente debe alcanzar estado de relajación profunda (USAS 0-10) en 10-15 minutos
- Requiere 2-3 sesiones de práctica antes de iniciar la exposición imaginada

Fase 2 — Construcción de jerarquía

- Listado de 8-12 situaciones relacionadas con el estímulo temido
- Ordenadas de menor a mayor ansiedad (USAS 10-100)
- Cada ítem debe ser claramente visualizable y formulado de forma específica

Fase 3 — Exposición imaginada con relajación

- El paciente se relaja profundamente. Se presenta el primer ítem para visualizar 10-15 segundos
- Si ansiedad > 25 USAS: detener, relajar completamente, repetir el mismo ítem
- Si ansiedad ≤ 25 USAS: avanzar al siguiente ítem de la jerarquía
- Sesiones de 20-30 minutos. Avanzar solo cuando cada ítem esté dominado

DIFERENCIAS CON LA EXPOSICIÓN IN VIVO

Desensibilización sistemática

- Exposición imaginada (no necesariamente in vivo)
- Siempre precedida de relajación profunda
- Protocolo más estructurado y lento
- Útil cuando la exposición real es difícil o imposible

Exposición gradual in vivo

- Exposición al estímulo real directamente
- Sin relajación obligatoria previa
- Mayor eficacia y generalización
- Primera línea para fobias específicas si es viable

INDICACIONES Y LIMITACIONES

Indicada en

- Fobias específicas
- Ansiedad ante procedimientos médicos
- Miedo a hablar en público
- Cuando la exposición in vivo no es posible o práctica

Limitaciones

- Menos eficaz que in vivo en fobia social
- No es primera línea en TOC
- Requiere buena capacidad de imaginación vívida
- Proceso más largo que in vivo