

76 OCLUSÃO INTESTINAL - TRATAMENTO ENCOSCÓPICO COM COLOCAÇÃO DE PROTESES METÁLICAS AUTO-EXPANSÍVEIS

Meireles L., Sousa P., Freitas L., Lopes J. , Ferreira C., Palma R., Maldonado R., Luis Carrilho Ribeiro, José Velosa

Introdução: A colocação de próteses metálicas auto-expansíveis (PMAE) é um procedimento minimamente invasivo e simples. É um tratamento de primeira linha eficaz para o alívio de sintomas obstrutivos servindo tanto como um procedimento de "ponte para a cirurgia", como uma forma de tratamento paliativo. **Objetivos:** Analisar retrospectivamente a colocação de PMAE no tratamento de doentes com obstrução colo-rectal maligna. **Material e Métodos:** Análise retrospectiva de 39 doentes consecutivos que colocaram PMAE do cólon ou recto, entre 2010 e 2013, num único centro. Analisaram-se os dados demográficos, indicação, tipo e tamanho das próteses, localização da lesão, bem como sobrevida dos doentes. **Resultados:** Foram avaliados 39 doentes (21 sexo masculino; idade média de 68 ± 15 anos). A maioria das lesões eram localizadas no recto (69%), 20% no cólon sigmoide, 8% no colon descendente e 2% no cólon transverso. O comprimento médio das lesões era de 53 ± 25 mm. Quase todos os procedimentos foram realizados com intuito paliativo, tratando-se de doente com adenocarcinoma em estadio IV (estadio T, N e M da 7ª edição da *American Joint Committee on Cancer*). Em 2 casos a colocação de próteses foi precedida de dilatação com velas de Savary Miller. Foram colocadas próteses totalmente descobertas em 100% dos casos. O comprimento das próteses colocadas variou entre 80 e 120mm e o diâmetro do lúmen entre 20 e 30mm. No que respeita as complicações imediatas, ocorreu apenas um caso de migração, não se verificou nenhuma perfuração. Dos doentes que colocaram prótese, 21 doentes faleceram até à data da colheita dos dados, sendo o intervalo médio entre a colocação de prótese e o óbito 3 ± 5 meses. **Conclusão:** Os quadros oclusivos intestinais podem ser tratados com o uso de técnicas endoscópicas, sendo a colocação de PMAE segura e eficaz no tratamento de quadros oclusivos do cólon e recto.

Centro Hospitalar Lisboa Norte