

72 TRATAMENTO ENDOSCÓPICO DA OBSTRUÇÃO GÁSTRICA PRECOCE ASSOCIADA A SLEEVE

Costa M., Capela T., Silva M. J., Seves I., Canena J., Rio-Tinto R.

Introdução:

A obesidade é uma doença complexa, de proporções epidémicas, que obriga a uma abordagem terapêutica multidisciplinar. Nas últimas duas décadas a cirurgia bariátrica adquiriu um papel de destaque sendo o tratamento com melhores resultados a longo prazo, mas está associada também a morbilidade e mortalidade significativas. A obstrução gástrica precoce por um mecanismo de torção em doentes submetidos a gastroplastia vertical (*sleeve*) é uma raridade, não existindo na literatura registo de casos em que o tratamento foi endoscópico. O mecanismo proposto para a torção gástrica pós-*sleeve* relaciona este evento com uma justaposição incorrecta das paredes gástricas durante a técnica cirúrgica.

Objectivo:

Avaliar a eficácia e segurança do tratamento endoscópico utilizando próteses metálicas autoexpansíveis (PMAE) totalmente cobertas no tratamento da torção gástrica pós-*sleeve*.

Material e Métodos:

Análise de dois casos referenciados ao Serviço de Gastreenterologia para tratamento endoscópico da torção gástrica pós-*sleeve*. Utilizaram-se PMAE totalmente cobertas para restabelecer a patência imediata do lúmen.

Resultados:

Foram identificados dois doentes de 24 (?) e 25 anos (?). A intolerância alimentar surgiu 10 e 24 dias após a cirurgia. As torções gástricas foram documentadas por estudo contrastado e as endoscopias altas mostraram no segmento proximal do estômago lúmen amplo seguido de torção condicionando obstrução. Colocaram-se PMAE totalmente cobertas nos 2 casos restabelecendo-se a permeabilidade luminal com resolução imediata da intolerância alimentar. As próteses foram removidas endoscopicamente 2 e 3 meses depois, sem complicações, e os doentes tiveram alta no dia a seguir ao procedimento. No seguimento até aos 2 anos não houve recidiva das queixas em nenhum dos doentes.

Conclusão:

A utilização de PMAE totalmente cobertas para tratamento da torção gástrica pós-*sleeve* é uma técnica eficaz e segura.

Serviço de Gastreenterologia do Hospital de Sto. António dos Capuchos – Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.