

Magalhaes MJ, Castro-Poças F, Araújo T, Lago P, Moreira T, Pedroto I

**INTRODUÇÃO:** Os cistos de duplicação são anomalias congénitas raras, podendo afectar qualquer parte do tracto digestivo. Nos adultos são geralmente achados endoscópicos ou imagiológicos que por vezes constituem desafios diagnósticos e podem cursar com graves complicações. **OBJECTIVO:** Descrever a experiência dum centro no diagnóstico dos cistos de duplicação através da ecoendoscopia alta (EE). **MÉTODOS:** Realizou-se uma análise retrospectiva às EE realizadas entre 2000 e 2013, cujo diagnóstico foi cisto de duplicação, caracterizando-se os doentes e os achados endoscópicos/imagiológicos. Analisou-se o contributo diagnóstico da punção aspirativa por agulha fina (PAAF). **RESULTADOS:** Entre 2000 e 2013, 23 pacientes (16 homens (69,6%)), com idade média de  $51,9 \pm 15,9$  anos, foram submetidos a EE, cujo diagnóstico final foi de cisto de duplicação. Previamente à EE: 19 realizaram endoscopia digestiva alta (EDA), 13 dos quais por sintomas como dispepsia (n=9) e disfagia (n=4). Das 19 EDA, 3 não apresentavam alterações endoscópicas e em 16 havia suspeita de lesão subepitelial (10 esofágicas); Quatro doentes tinham estudo por tomografia axial (TAC), 2 dos quais com suspeita de cistos de duplicação esofágicos. Na EE foram detectadas 16 lesões anecogénicas com critérios ecoendoscópicos de cisto de duplicação no esófago (tamanho médio 24,2x14,2 mm; 7 com material ecogénico no interior) e 7 no estômago (tamanho médio 23,6x14,1 mm; 2 com conteúdo fluído e septos). Por dúvidas diagnósticas, realizaram-se 8 PAAF (5 no esófago), em 75% dos casos através de uma passagem de agulha de 22G. Houve confirmação citopatológica em 3 casos, e excluídas outras entidades em outros 3 casos. Quatro doentes fizeram TAC posteriormente à EE, havendo concordância diagnóstica num caso. Foi feita vigilância por EE anual a 9 doentes, registando-se estabilidade morfodimensional em todos. **CONCLUSÕES:** A EE desempenha um papel central no diagnóstico, e vigilância, de uma entidade que, apesar de rara, tem riscos e complicações graves descritas.

Centro Hospitalar do Porto-Hospital de Santo António