

# 1 OS NOVOS DOENTES COM HEPATITE C: CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA, VIROLÓGICA E ESTÁDIO DE DOENÇA DOS REFERENCIADOS “DE NOVO” A UMA CONSULTA HOSPITALAR

Russo P., Costa M.N., Silva M.J., Côrte-Real R., Calinas F.

Introdução e Objetivo: Aceita-se que 2/3 dos infetados pelo VHC em Portugal estejam por diagnosticar/estudar. É plausível que estes desconhecidos se possam assemelhar aos presentemente referenciados “de novo” a uma consulta e que sejam distintos da casuística global enviesada pela retenção, ao longo de 2 décadas, de não-tratados ou não-respondedores ao tratamento.

Pretendemos caracterizar os novos casos referenciados a uma consulta de Hepatologia.

Doentes e Métodos: Doentes referenciados entre 2010-2013 a consulta hospitalar de Hepatologia. Incluídos todos aqueles com estudo para decisão terapêutica concluído. Analisadas características demográficas, virológicas e estágio da doença: genotipagem VHC por VERSANT® HCVGenotype 2.0, LiPA; graduação fibrose (METAVIR) por FibroScan® ou biopsia.

Resultados: Avaliados 279 doentes (203 homens - 72,8%) com idade média de 47 anos. Distribuição por genótipos: G1 em 161 doentes (57,7%), dos quais, 1a-105 (37,6%), 1b-52 (18,6%), 1(s/subtipo)-4; G2 em 4 doentes (1,4%); G3 em 68 (24,4%); G4 em 44 (15,8%); G5 e G6 em 1 doente, cada.

Distribuição dos graus de fibrose: F0-1: 146 doentes(52,3%), F2: 38 (13,6%), F3: 31 (11,1%), F4: 64 (22,9%).

Na tabela, apresenta-se a distribuição proporcional dos graus de fibrose de acordo com genótipo VHC:

	F0-F1	F2	F3	F4
G1a (n=105)	56%	13%	13%	17%
G1b (n=52)	44%	19%	8%	29%
G3 (n=68)	43%	9%	16%	32%
G4 (n=44)	66%	16%	2%	16%

Média de idades dos doentes com F0-2 e F3-4 de 44,0 e 51,3 anos, respetivamente. Média de idades dos infetados pelos genótipos 1a, 1b, 3 e 4: 45,9; 52,1; 47,2 e 43,9 anos, respetivamente.

Conclusões: Dominio do genótipo 1a vs 1b e incremento do genótipo 4 face a séries anteriores. A doença avançada está presente em cerca de 1/3 dos novos casos, afeta particularmente os infetados pelo genótipo 3 e é diagnosticada em torno dos 50 anos de idade.

Serviços de Gastreenterologia e de Patologia Clínica do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE