

Les Testicules

I- introduction

Les testicules sont les gonades mâles productrices des spermatozoïdes, mais aussi des glandes à sécrétion endocrine (hormones sexuelles : testostérone). Au nombre deux, ils sont situés dans le scrotum au fond duquel ils sont solidarisés par les ligaments scrotaux.

Le testicule gauche descend en général plus bas que le testicule droit. Nous rappelons que les testicules à l'état embryonnaire, avaient une situation lombaire à hauteur des reins. Au cours du développement, les testicules s'abaissent et sortent de la cavité abdominale à travers le canal inguinal, ils pénètrent les bourses (scrotum) ce qui constitue leur situation définitive à la naissance. Les anomalies de migration des testicules sont à l'origine des situations anormales : les ectopies testiculaires.

II- Anatomie descriptive

1- forme, couleur, consistance

Le testicule est un ovoïde à grand axe oblique en haut et en avant.

Couleur : blanc bleuté

Consistance : ferme due à son enveloppe

Dimensions : longueur (grand axe) : 3 à 5 cm, le petit axe perpendiculaire au grand axe constitue la hauteur est de 2 à 3 cm ; épaisseur : 2,5 cm. Poids : 15 à 25 gramme.

2- Configuration extérieure

La surface extérieure du testicule est lisse et brillante, recouverte par une séreuse la vaginale.

Chaque testicule présente deux faces : médiale et latérale

Deux bords : postéro-supérieur et antéro-inférieur

Deux extrémités (pôles) supérieure et inférieure

Le testicule est entouré par une membrane résistante qui lui donne sa coloration bleutée et sa consistance : l'albuginée.

Il est coiffé sur son bord postéro-supérieur par l'épididyme.

C'est un organe mobile, sa mobilité est facilitée par la séreuse qui l'entoure : la vaginale.

Celle-ci recouvre toute sa face latérale et une partie de sa face médiale.

3- Constitution

Une coupe verticale suivant le grand axe du testicule montre que celui-ci est entouré d'une membrane fibreuse ; l'albuginée. Elle envoie des septums à l'intérieur du testicule le divisant en lobules en nombre de 250 à 300.

Les lobules contiennent les tubules séminifères (séminipares) très flexueux, au nombre de 2 à 4 par lobule.

L'albuginée présente un épaissement au niveau de la partie antérieure du bord postéro-supérieur appelé : le médiastin du testicule ou corps d'Highmore. Ce dernier contient le rete testis.

III- Les voies spermatiques

Ce sont les voies d'excrétion du sperme testiculaire, elles s'étendent des canalicules séminifères à l'urètre.

1- les voies spermatiques intra-testiculaires

- les tubes droits drainent les tubules séminifères
- le rete testis : les tubes droits se jettent dans un réseau de canaux anastomosés : le rete testis ou réseau testiculaire.
- les cônes efférents : relient le rete testis à l'épididyme au nombre de 8 à 12.

2- les voies spermatiques extra-testiculaires

Ils sont représentés par l'épididyme et le canal déférent

IV- Le scrotum

C'est un sac cutané-conjonctif formant une bourse où se logent les testicules. Il est divisé en deux par le septum scrotal. Il est formé par plusieurs couches, on distingue de la surface à la profondeur :

- la peau fine et plissée,
- le muscle dartos,
- le fascia spermatique externe,
- le muscle crémaster,
- le fascia spermatique interne,
- le feuillet pariétal de la membrane vaginale du testicule,
- le feuillet viscéral recouvre le testicule et s'étend sur une partie de l'épididyme ainsi que sur l'extrémité inférieure du cordon spermatique.

V- Le cordon spermatique

C'est le pédicule qui suspend le testicule et l'épididyme. Il est contenu à l'intérieur de la tunique fibreuse scrotale. Il contient

- le canal déférent, en avant de lui, l'artère spermatique et le plexus veineux spermatique antérieur.
- en arrière du canal déférent se trouve l'artère déférentielle et le plexus veineux spermatique postérieur. Les veines sont accompagnées de vaisseaux lymphatiques.

Il présente deux portions :

- funiculaire : entre testicule et épididyme d'une part et l'orifice superficiel du canal inguinal.
- inguinale : dans le canal inguinal entre ses deux orifices superficiel et profond à ce niveau se trouve les nerfs, ilio-inguinal et génito-fémoral.

Remarque : Hernie scrotale est le passage d'une partie du contenu de l'abdomen à travers l'orifice inguinal. Ce contenu descend dans le scrotum. L'étranglement herniaire est le risque le plus grave.

E- Vascularisation et innervation

1- testicule et voies spermatiques

Il est vascularisé par trois artères

- artère spermatique (testiculaire) naît de l'aorte abdominale à hauteur de L2, traverse le canal inguinal, se porte dans le cordon spermatique, elle se termine dans le testicule en deux branches terminales
- artère déférentielle naît de l'artère iliaque interne rejoint le cordon spermatique elle se termine au niveau de l'anse épididymo-déférentielle en deux ou trois rameaux.
- artère crémasterique naît de l'artère épigastrique inférieure, elle rejoint le cordon spermatique, elle se distribue au testicule et aux enveloppes du cordon spermatique.

Les veines se forment aux pôles du testicule deux réseaux :

- un postérieur rétro-déférentiel qui rejoint la veine épigastrique inférieure.
- un antérieur pré-déférentiel, qui donne naissance à la veine testiculaire, elle rejoint la veine cave inférieure à droite et la veine rénale à gauche.

Les lymphatiques rejoignent les lymphonœuds aortiques et inter-aortico-caves

- Innervation : des branches du plexus cœliaque et des branches du plexus hypogastrique.


2- le scrotum


Les artères sont des branches de l'artère pudendale externe (branche de la fémorale), et des branches l'artère pudendale interne (branche de l'artère iliaque interne)

Les veines se jettent dans la crosse de la veine grande saphène et la veine pudendale interne.

Les lymphatiques rejoignent les lymphonœuds inguinaux superficiels.

Les nerfs sont des branches des nerfs : pudental, ilio-hypogastrique et génito-fémoral.





Références

Rouviere .H et Delmas A. Anatomie Humaine, Descriptive, Topographique et Fonctionnelle. Tome II, éd. Masson 1985.
 Trouilloud P. Introduction à l'anatomie édition ellipses 2010