

Thème du TD : Pharmacovigilance

Exercice 1

Un sujet traite régulièrement avec un médicament aérosol X depuis 5 ans les examens cliniques et radiologiques indiquent la présence d'une masse probablement tumorale au niveau pulmonaire, en attendant des explorations de confirmation (bronchoscopie) on a décidé d'un arrêt du traitement qui n'a eu aucun effet sur l'évolution de la maladie . Le sujet est grand fumeur depuis 20 ans.

Évaluez l'imputabilité intrinsèque relative à la responsabilité du médicament dans l'apparition d'une tumeur pulmonaire chez ces sujets.

Exercice 2

En 1979 Une femme de 28 ans a pris diéthylstilbestol pour une menace d'avortement. Elle donne naissance peu après à une petite fille.

En 1996 elle apprend par les médias que des filles nées de mères traitées par ce médicament ont développé un cancer du vagin. Sachant que la fille se plaint de saignements anormaux et des pertes vaginales, la mère a proposé à sa fille de 16 ans faire une biopsie. Le résultat confirme un cancer du vagin.

Donnez les scores chronologiques, sémiologiques ainsi que l'imputabilité intrinsèque relatifs au risque tératogène du médicament.

Exercice 3

Un patient hospitalisé reçoit pour la première fois un médicament anti-infectieux récemment mis sur le marché. Rapidement après l'administration_ (une heure environ), le malade commence à présenter des signes cliniques typiques d'une hypoglycémie , le médecin ordonne alors, de faire un dosage de la glycémie ,mais le laboratoire de Biochimie a refusé de rendre le résultat car le prélèvement n'était pas conforme. Le médecin décide d'arrêter_le_traitement et de mettre le malade sous observation, l'état de ce dernier s'améliore rapidement après l'arrêt du traitement.

Après enquête, on vous informe aussi, que le malade n'a pris aucun aliment (nourriture) dans les 24 heures qui ont

précédé la prise du médicament. Vous consultez les principales sources de la littérature médicale (RCP, Dictionnaire VIDAL... etc.), mais vous ne trouvez aucune information relative à un risque hypoglycémie lié à la prise de ce médicament, cependant une revue médicale a publié les résultats d'une étude anglaise qui rend ce médicament responsable d'hypoglycémies (sémiologiquement et biologiquement caractérisées) chez certains patients.

Évaluez la probabilité que ce médicament soit responsable de l'hypoglycémie, en déterminant :

- l'imputabilité intrinsèque (après calcul des scores sémiologiques et chronologiques)
- l'imputabilité extrinsèque.

Exercice 4

Un sujet est hospitalisé pour un épisode caractérisé par des troubles de la conscience agitation anxiété, sudation...Après interrogatoire, le sujet révèle qu'il est sous traitement antidépresseur mais qu'il ne le prend plus depuis quelque jours à cause d'une rupture commerciale. Le pharmacien hospitalier lui délivre ce médicament, et les médecins observent immédiatement une disparition des symptômes.

De quel syndrome s'agit-il ?et évaluez l'imputabilité intrinsèque relative à la responsabilité du médicament dans son apparition

Administration	Délai d'apparition						
	suggestif			compatible			Non compatible
Arrêt	Ré administration						
	+	0	-	+	0	-	
Evolution suggestive	C3	C3	C1	C3	C2	C1	C0
Evolution non concluante	C3	C2	C1	C3	C1	C1	C0
Evolution non suggestive	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C0

Sémiologie	Evocatrice			Autres éventualités		
Autre explication	Examen complémentaire spécifique fiable					
	+	0	-	+	0	-
Absente	S3	S3	S1	S3	S2	S1
Possible	S3	S2	S1	S3	S1	S1

Chronologie		Sémiologie		
		S1	S2	S3
	C0	I0	I0	I0
	C1	I1	I1	I2
	C2	I1	I2	I3
	C3	I3	I3	I4