

VASCULARISATION VEINEUSE ET LYMPHATIQUE DU CŒUR

PLAN

I. VASCULARISATION VEINEUSE

1. Système du sinus coronarien
2. Système des veines profondes

II. DRAINAGE LYMPHATIQUE

I. VASCULARISATION VEINEUSE

1- INTRODUCTION

Le cœur est drainé par deux systèmes :

Un système principal, superficiel ou système du sinus coronaire; regroupant les veines superficielles, satellites des artères coronaires et se draine dans l'atrium droit.

Un système accessoire intra-myocardique; constitué par les veines profondes qui vont se jeter directement dans les cavités cardiaques;

Les veines minimes du cœur (veines de Thébesius).

Les petites veines du cœur (veines de Gallien).

2- SYSTEME DU SINUS CORONARIEN

Comprend:

- ✓ Le sinus coronaire
- ✓ Les affluents du sinus coronaire (veines afférentes).

a- Le sinus coronaire :

- C'est un segment veineux dilaté (ampullaire), long de 3 cm et large de 1 cm.
- L'origine coïncide avec la terminaison de la grande veine du cœur.
- Il occupe la partie terminale du sillon atrio-ventriculaire gauche.
- Il se termine à la face inférieure de l'atrium droit par un orifice valvulé (valvule de Thébesius), situé en avant et en dedans de l'orifice de la veine cave inférieure.
- Le sinus coronaire ne collecte que 60 à 70% du sang veineux cardiaque, le reste est collecté par le système des veines cardiaques antérieures et par les veines de Thébesius.

b- Les affluents du sinus coronaire :

1-La grande veine du cœur ou grande veine coronaire : c'est l'affluent principal.

Elle naît dans le sillon interventriculaire antérieur, près de l'apex. Elle remonte dans ce sillon à gauche de l'artère interventriculaire antérieure, puis s'infléchit vers la gauche pour rejoindre le sillon atrio-ventriculaire gauche, et se termine sur la face postérieure dans le sinus coronaire dont elle est séparée par la valvule de Vieussens.

Au cours de son trajet elle reçoit des branches collatérales :

- ✓ Les veines ventriculaires droites et gauches ;
- ✓ Veine marginale gauche;
- ✓ Les veines du septum interventriculaire ;
- ✓ Les veines de l'atrium et de l'auricule gauche.

2- Les autres afférences du sinus coronaire sont moins importantes :

- ✓ La veine moyenne du cœur (veine interventriculaire inférieure): Elle naît près de l'apex, et parcourt le sillon interven-triculaire postérieur.
- ✓ Les veines postérieures du ventricule gauche
- ✓ La petite veine du cœur (petite veine coronaire) qui chemine dans le sillon coronaire droit inférieur, près de l'artère coronaire droite.
- ✓ La veine oblique de l'atrium gauche ou veine de Marshall.

3- SYSTEME DES VEINES PROFONDES :

Deux groupes de veines intramyocardiques vont se jeter directement dans les cavités cardiaques

- ✓ Les veines antérieures du cœur ou petites veines du cœur (veines de Gallien)
- ✓ Les veines minimes du cœur (veines de Thebesius)

a- Les veines antérieures du cœur ou petites veines du cœur (veines de Gallien)

Elles sont situées à la face antérieure de l'atrium et du ventricule droits. Elles s'abouchent directement dans l'atrium droit, par de petits orifices ou pores de Vieussens ou foramina de Lannelongue.

La plus volumineuse ; la veine du bord droit est satellite de l'artère du bord droit.

b- Les veines minimes du cœur (veines de Thebesius)

Elles sont essentiellement situées au niveau du cœur droit. Elles s'abouchent dans les quatre cavités cardiaques par de petits orifices ou pores de Vieussens ou foraminula de Lannelongue.

II. DRAINAGE LYMPHATIQUE

Le cœur présente 3 réseaux lymphatiques:

Deux profonds:

- Un réseau sous endocardique
- Un réseau intra myocardique; qui n'est évident qu'au niveau des atriums.

Un superficiel :

- Sous épicaordique: reçoit la lymphe des deux précédents par des collecteurs péri-artériels.

Le réseau sous-épicaordique est drainé par deux collecteurs :

- Le collecteur principal gauche
- Le collecteur accessoire droit
- **Le collecteur principal gauche :** Il est situé à gauche, et formé de deux à trois vaisseaux lymphatiques, qui drainent les ventricules. Il chemine dans le sillon interventriculaire antérieur, puis contourne à gauche le tronc pulmonaire, pour se terminer dans les lymphonœuds trachéo-bronchiques inférieurs puis le conduit lymphatique droit, donc le confluent jugulo-sous-clavier droit.
- **Le collecteur accessoire droit :** Situé à droite, il draine l'atrium droit et le bord droit du ventricule droit. Il suit l'artère coronaire droite, puis parcourt la face antérieure de l'aorte et se termine dans les lymphonœuds prévasculaires puis le canal thoracique, donc le confluent jugulo-sous-clavier gauche.