

LE PHARYNX

I-Introduction :le pharynx est un conduit musculo-membraneux qui s'étend verticalement, en avant de la colonne vertébrale cervicale ,en arrière des cavités nasales ,de la cavité orale et du larynx ,depuis la base du crâne jusqu'au bord inférieur de C6 .

Il se continue en bas avec l'œsophage ,il communique d'une part la cavité orale avec l'œsophage et d'autre part les fosses nasales avec le larynx(carrefour aéro-digestif).

Le pharynx joue un rôle dans :la déglutition ,la respiration et la phonation .

II-Anatomie descriptive :

C'est un entonnoir irrégulier évasé en haut et rétréci en bas ,étendu de la base du crâne au bord inférieur du cartilage cricoïde en regard de C6 où il se continue par l'œsophage.

Dimensions :

Longueur :15 cm au repos ,quand il se contracte son extrémité inférieure s'élève et sa longueur diminue de 3cm.

Diamètre :5cm dans sa partie nasale ,4cm dans sa partie orale et 2cm sa partie laryngée.

Il est toujours béant et ses parois antérieure et postérieure sont distantes d'au moins 2cm.

III-Configuration interne :

on divise la cavité pharyngienne en trois parties étagées :

Supérieure ou nasale ,moyenne ou buccale ,inférieure ou laryngienne.

La partie nasale est partiellement séparée de la partie orale par une cloison musculo-membraneuse le palais mou (voile du palais).

1-Le nasopharynx ou rhino-pharynx ou partie nasale du pharynx : (cavum nasal) ;S'étend de la base du crâne en haut jusqu'au voile du palais en bas présente :

--Une Paroi supérieure: ou toit correspond au corps du sphénoïde et corps de l'os occipital ,elle se porte en arrière et en bas et se confond avec la paroi postérieure

Cette paroi présente la **tonsille pharyngienne**.

--Une paroi postérieure :fait suite à la paroi supérieure et devient verticale et répond au corps de C1.

--Deux parois latérales :présentent l'ostium pharyngien de la trompe auditive (orifice pharyngien de la trompe d'eustache).Cet orifice saillant et triangulaire , limitée par le bourrelet du pavillon tubaire ou TORUS (cartilage de la trompe) qui se prolonge par deux replis muqueux .

La muqueuse qui entoure cet orifice tubaire présente un amas de follicules clos appelé tonsille tubaire. En arrière du torus se trouve la fossette de Rosenmüller.

--Une paroi inférieure : incomplète mobile formée par le voile du palais.

--Une Paroi antérieure: représentée par les choanes (orifices postérieurs de fosses nasales).

2-L'oropharynx ou bucco pharynx ou la partie buccale du pharynx :

Située entre le voile du palais en haut et le bord supérieur de l'épiglotte en bas .

Elle communique avec la cavité orale par l'isthme de Gosier

L'isthme de Gosier est limité par :

en haut le voile du palais, en bas la base de la langue ,latéralement les piliers antérieurs du voile (arcs palato-glosses) .C'est un carrefour où se fait le croisement des aliments et de l'air, présente :

Une paroi postérieure : répond aux corps vertébraux des 2^{me} et 3^{eme} vertèbres cervicales.

Une paroi antérieure : communique avec la cavité orale par l'isthme de Gosier,

Une paroi supérieure est le voile du palais

Deux parois latérales correspondent aux piliers antérieur et postérieur du voile,(arcs palato-glosse et palato-pharyngien) .ces deux piliers ou arcs délimitent la fosse tonsillaire (loge amygdalienne)où se loge la tonsille palatine.

La tonsille palatine (amygdale palatine):Volumineux amas de follicules lymphoïde clos ,en forme d'amande allongé de haut en bas et aplati de dehors en dedans .

Mesure 2CM de hauteur ,1,5 CM de large et 1CM d'épaisseur.

La face médiale est libre et plus au moins saillante dans la cavité pharyngienne , recouverte de la muqueuse présente les cryptes tonsillaires.

La face latérale formée par la capsule tonsillaire qui n'adhère pas aux éléments voisins de la paroi du pharynx ,séparée d'eux par un tissu cellulaire lâche sous muqueux qui permet d'écarter facilement la tonsille .

3- Le laryngo-pharynx -la partie inférieure du pharynx ou hypo-pharynx :

Située entre le bord supérieur de l'épiglotte en haut et le bord inférieur du cartilage cricoïde en bas répond :

-En avant au larynx formé de haut en bas :épiglotte,l'orifice supérieur du larynx ,les faces postérieures des cartilages aryénoïdes et cricoïde et les muscles qui les recouvrent.

-Sa paroi postérieure répond au corps vertébraux de C4 à C6.

-Ses parois latérales délimitent avec la paroi postérieure les gouttières pharyngo-laryngées ou **sinus piriformes**

-Son extrémité inférieure est représentée par la bouche de œsophagienne de Killian(bourrelet muqueux),en arrière du cartilage cricoïde.

IV-STRUCURE : la paroi pharyngienne est constituée de quatre couches de dedans en dehors :la muqueuse ,le fascia intra-pharyngien ou pharyngien ,la couche musculaire et le fascia péri pharyngienne (pharyngo-basilaire).

1-La muqueuse

2-Le fascia intra pharyngien :couche sous muqueuse ,

3-les muscles :deux groupes :les muscles constricteurs du pharynx et les muscles élévateurs du pharynx .

Les muscles constricteurs :muscles plats et minces forment une gouttière concave en avant ,

3 muscles :**Le muscle constricteur supérieur du pharynx** :

origine :- processus ptérygoïde , -le ligament ptérygo-mandibulaire

-la ligne mylo- hyoïdienne -les bords latéraux de la langue

terminaison :le raphé médian et le tubercule pharyngien de l'occipital.

Le muscle constricteur moyen :

Origine : petites cornes et bord supérieur de la grande corne de l'os hyoïde et ligament stylo-hyoïdien.

Terminaison :le raphé médian.

Le muscle constricteur inférieur :

Origine :face latérale du cartilage thyroïde et arc cricoïdien

Terminaison :sur le raphé médian

Action :la contraction entraîne le rétrécissement de la cavité pharyngienne.

le constricteur supérieur provoque la formation d'un bourrelet muqueux dans la déglutition isolant ainsi le naso-pharynx.

Celle du constricteur inférieur forme le sphincter pharyngo-oesophagien qui s'oppose au passage de l'air dans l'œsophage.

Les muscles élévateurs :

Le muscle stylo-pharyngien : long et grêle , naît du processus styloïde et se termine par trois faisceaux sur : le fascia péripharyngien (pharyngo-basilaire) , épiglote et le cartilage thyroïde élévateur du pharynx et du larynx .

Le muscle palato-pharyngien:

Origine : par trois chefs :-sur le fascia palatin, le cartilage tubaire , sur le processus ptérygoïde.

Se terminent sur les faces latérales du pharynx et cartilages thyroïde.'

4-Le fascia péripharyngien (pharyngo-basilaire) : est le feuillet de revêtement des faces latérales et postérieure des muscles constricteurs . Membrane fibreuse assez résistante qui s'attache à la base du crâne .

V-Rapports:

En avant : les fosses nasales , la cavité orale et le larynx.

En arrière : l'espace rétro-pharyngien et le rachis cervical de C1 à C6.

Latéralement: --En haut à espace latéro-pharyngé ou maxillo-pharyngien et le contenu de cet espace:

Artère carotide et veine jugulaire interne , nerfs glosso-pharyngien IX , vague X, accessoire XI, hypoglosse XII et sympathique en arrière, la parotide , artère carotide externe

---En bas : le paquet vasculo-nerveux du cou (artère carotide commune , veine jugulaire interne et nerf vague X) et lobes de la glande thyroïde.

VI--Vaisseaux et nerfs du pharynx :

1-LES ARTERES:

Les artères pharyngiennes ascendantes (carotide externe)

Accessoirement les artères thyroïdiennes supérieures (carotide externe) , les artères palatines ascendantes (artères faciales) , les artères pterygo-palatines (de la maxillaire) .

2-Les veines : i se jettent dans la veine jugulaire interne.

3-les lymphatiques : rejoignent les nœuds rétro-pharyngiens et jugulaires internes.

4-Nerfs : Innervation sensitivomotrice : nerfs glosso-pharyngien IX et vague X

Végétative; nerf vague et sympathique.


-----FIN-----



Références :

H. Rouvière -A.Delmas Anatomie Humaine tome I TÊTE ET COU


Si Salah Hammoudi anatomie appareil digestif

P Kamina tête et cou muscles , vaisseaux , nerfs et viscères.





Muscles du pharynx ouvert partiellement : vue postérieure



Vue postérieure du pharynx : nerfs et vaisseaux

