

ANATOMIE DU RECTUM

I. INTRODUCTION :

Le rectum est la partie terminale du tube digestif, il fait suite au côlon sigmoïde. C'est un réservoir des matières fécales et il permet de contrôler la continence fécale et la défécation. Situé dans le petit bassin (partie postéro-médiane)

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE :

a) Situation et limites : Situé :

- En avant du sacrum et du coccyx.
- En arrière des organes uro-génitaux.
- Il fait suite au côlon sigmoïde, en regard S3, par la jonction rectosigmoïdienne.
- Il se termine par l'anus, au niveau de la ligne ano-cutanée, dans le périnée postérieur.

b) Configuration externe :

- **Sur le plan frontal** il présente 3 courbures :

- ✓ Supérieur convexe à droite.
- ✓ Moyenne convexe à gauche.
- ✓ Inférieure convexe droite.

- Il n'y a sur la paroi rectale ni bosselures, ni appendices épiploïques, mais on note la présence de travées musculaires longitudinales (correspondant à l'étalement progressif des bandelettes sigmoïdiennes).

- **Sur le plan sagittal** Il présente deux segments séparés par un angle :

- ✓ Un segment Supérieur, pelvien : *le rectum pelvien* ; oblique en bas et en avant qui s'élargit formant l'ampoule rectale.
- ✓ Un segment Inférieur : *le rectum périnéal* appelé *canal anal*. Oblique en bas et en arrière qui s'ouvre par l'anus.
- ✓ Le Cap ou coude du rectum : sépare les deux segments et forme un angle de 80°.

c) Dimensions

➤ **Longueur :**

- Rectum pelvien : 15 à 20cm
- Canal anal : 2 à 3 cm

➤ **Calibre :**

- Ampoule rectale : 3 à 6 cm L'extensibilité est importante.
- Canal anal : 2 cm.

d) Configuration intérieure :

Explorée facilement par anoscopie, rectoscopie ou lors d'une colonoscopie.

➤ **Rectum pelvien :** la muqueuse est rosée, présente deux types de plis muqueux :

- Plis temporaires, verticaux qui s'effacent par la distension du rectum.
- Plis permanents, transversaux ou valvules de Houston, au nombre de trois semi-lunaires.

- **Canal anal** : Divisé en 3 zones :

1-Zone rectale ou zone muqueuse : présente :

- Colonnes rectales ou colonnes de Morgani : saillies longitudinales, au nombre de 6 à 8 (siège du plexus hémorroïdal interne).
- Valvules anales (de Morgagni) : plis semi-lunaires, qui réunissent en bas les colonnes anales.
- Sinus anaux (de Morgagni) : fossettes comprises entre les valvules et la paroi anales où s'abouchent les glandes anales.

- Les limites de la zone rectale :

- La limite supérieure : ligne ano-rectale.
- La limite inférieure : ligne pectinée ou ano-cutanée.

2. Zone ano-cutanée ou de transition :

- Lisse située au-dessous de la zone rectale, haute de 1,5cm, dépourvue de poils et de glande, de couleur blanc bleuté et brillant (plexus veineux sous-jacent).

3. Zone cutanée :

- Haute de 1cm.
- Marge anale (revêtement cutané : pigmentée, poils, glandes sébacées et sudoripares.)

La jonction entre la zone de transition et cutanée est la ligne blanche de Hilton

e) Structure :

- Quatre tuniques superposées de la superficie à la profondeur :

- Séreuse péritonéale : incomplète car le péritoine recouvre seulement la partie supérieure des faces antérieure et latérales du rectum.
- Musculeuse : deux couches ; externe, longitudinale et Interne, circulaire et s'épaissit autour du canal anal pour former le sphincter interne de l'anus.
- Sous-muqueuse : contient le réseau veineux hémorroïdal.
- Muqueuse : rose.

- L'appareil sphinctérien de l'anus :

Permet de fermer activement le canal anal, formée par :

- ✓ Le muscle sphincter interne de l'anus : Fibres musculaires lisses. Son bord inférieur est haut de 2cm, peut être palpé chez le vivant
- ✓ Le muscle sphincter externe de l'anus : fibres musculaires striées.
- ✓ Le chef pubo-rectal du muscle releveur de l'anus : Situé au-dessus des sphincters, externe et interne. Assure la continence anale.

III. RAPPORTS

1. RAPPORTS PERITONEAUX :

- La partie supérieure des faces antérieure et latérales sont tapissés par le péritoine (c'est le prolongement du péritoine viscéral du côlon sigmoïde).
- La face postérieure et la partie inférieure des faces antérieure et latérales sont sous-péritonéales
- Le péritoine se réfléchit en avant Sur la vessie chez l'homme formant le cul-de-sac de Douglas : recto-vésical et sur l'utérus chez la femme formant le cul-de-sac de Douglas : recto-utérin
- Le péritoine se réfléchit latéralement sur la paroi pelvienne formant : le cul de sac para-rectal.
 - ❖ Donc le rectum pelvien est divisé par le péritoine en deux segments : péritonéal et sous-péritonéal contenu dans la loge rectale

La loge rectale : Gaine fibreuse contenant le rectum sous-péritonéal formée par quatre lames fibreuses :

En avant : la cloison recto-génitale formant :

- Chez l'homme : aponévrose prostatopéritonéale de Denonvilliers
- Chez la femme : septum recto-vaginal

En arrière : Fascia rétro-rectal

Latéralement : les lames sacro-recto-génito-pubiennes

2. RAPPORTS AVEC LES ORGANES :

A- Rapports antérieurs :

- Chez l'homme : Cul de sac recto-vésical, La lame prostatopéritonéale de Denonvilliers
La vessie, les uretères, les canaux déférents, les vésicules séminales la prostate et l'urètre
- Chez la femme : Le cul de sac recto-utérin, le fascia recto-vaginal, l'utérus et le vagin

B- Rapports postérieurs : L'espace retro-rectal contenant :

- Les vaisseaux sacrés moyens, le sympathique sacré, Le muscle pyramidal et Le sacrum et coccyx

C- Rapports latéraux :

- Le côlon pelvien ; les anses grêles, les uretères, les vaisseaux iliaques internes
- En plus chez la femme : Ovaires et trompes utérines

IV. L'appareil sphinctérien :

Formé par :

1) Le sphincter interne : muscle lisse involontaire constitué par l'épaississement de la couche musculaire Interne du rectum autour du 3/4 sup du canal anal

2) Le sphincter externe :

- muscle strié volontaire, entoure le sphincter lisse, composé de 3 couches :
 - Couche profonde : entoure la partie supérieure du sphincter lisse, indissociable du muscle pubo-rectal
 - Couche superficielle : entoure la partie inférieure du sphincter lisse. Rejoint le centre tendineux en avant et le ligament ano-coccygien en arrière.
 - Couche sous-cutané : situé au-dessous du plan du sphincter lisse.

V. VASCULARISATION :

1- vascularisation artérielle :

L'irrigation artérielle du rectum est assurée par les artères rectales (hémorroïdales) et l'artère sacrale médiane.

- Artères rectales supérieures : Branches terminales de l'artère mésentérique inférieure, assurent la quasi-totalité de la vascularisation de l'ampoule rectale
- Artères rectales moyennes : Naissent des artères iliaques internes (hypogastriques).
- Artères rectales inférieures : Naissent de chaque côté de l'artère honteuse (pudendale) interne.
- Artère sacrale médiane : Branche terminale de l'aorte. Descend verticalement en arrière du rectum et se termine sur la face postérieure du canal anal.

2- Vascularisation Veineuse :

- Le plexus veineux rectal est développé dans la tunique sous-muqueuse surtout dans le canal anal.
- En pathologie : la dilatation variqueuse de ces veines constitue les hémorroïdes.
- Le drainage veineux du rectum est tributaire des systèmes cave inférieur et porte.
- La disposition des veines est analogue à celle des artères.

▪ On distingue les veines rectales (supérieures, moyennes et inférieures) et la veine sacrée moyenne :

- Veines rectales supérieures : Tributaires du système porte et se terminent dans la veine mésentérique inférieure.
- Veines rectales moyennes : Tributaires du système cave inférieur ; se jettent dans les veines iliaques internes (hypogastrique).
- Veines rectales inférieures : Tributaires du système cave inférieur ; se jettent dans les veines honteuses internes, elles-mêmes tributaires des veines iliaques internes.
- Veine sacrée médiane : Naît en arrière du rectum, Monte verticalement jusqu'à la bifurcation de la veine cave inférieure et se termine dans la veine iliaque gauche.

NB / Intérêt pratique :

▪ La richesse du canal anal en plexus veineux et par ses anastomoses porto-cave explique la fréquence de la dilatation variqueuse ou hémorroïdes qui sont de règle en cas d'hypertension portale.



3- Drainage Lymphatique :




Les collecteurs lymphatiques sont organisés en 3 pédicules :

- Pédicules rectaux supérieurs : se drainent dans les nœuds de la chaîne mésentérique inférieure.
- Pédicules rectaux moyens se drainent dans les nœuds hypogastriques.
- Pédicules rectaux inférieurs : se drainent dans les nœuds inguinaux superficiels.

VI. INNERVATION :

- Plexus rectal supérieur : provient du plexus mésentérique inférieur.
- Plexus rectal moyen et inférieur : provenant du plexus hypogastrique inférieur.








FIG. 16.68. Constitution schématique du petit bassin masculin (coupe médiane)

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| A. espace rétropubien | 3. espace prépéritonéal | 10. a. sacrale médiane et espace | 16. rétinaculum caudal |
| B. espace profond du périnée | 4. lig. ombilical médian | présacral | 17. lig. et m. ano-coccyg |
| C. espace rétropéritonéal | 5. fascia ombilico-prévésical | 11. fascia présacral | 18. m. élévateur de l'anus |
| D. cul-de-sac recto-vésical | 6. fascia superficiel de l'abdomen | 12. espace rétrorectal | 19. centre tendineux du |
| E. espace superficiel du périnée | 7. fascia prostatique | 13. fascia rétrovésical | m. recto-urétral |
| 1. ligne blanche | 8. fascia superficiel du pénis | 14. fascia rectal | 20. espace rétroprostatique |
| 2. fascia transversalis | 9. a. rectale sup. | 15. septum et fascia recto-vésical | |




FIG. 16.69. Constitution schématique du petit bassin féminin (coupe médiane)

- | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| A. espace rétropubien | 4. lig. ombilical médian | 11. a. rectale sup. |
| B. espace profond du périnée | 5. fascia ombilico-prévésical | 12. a. sacrale médiane et espace |
| C. espace rétropéritonéal | 6. fascia superficiel de l'abdomen | présacral |
| D. cul-de-sac vésico-utérin | 7. septum uro-génital | 13. fascia présacral |
| E. cul-de-sac recto-utérin | 8. fascia superficiel du diaphragme uro-génital | 14. espace rétrorectal |
| 1. ligne blanche | (membrane périnéale) | 15. fascia rectal |
| 2. fascia transversalis | 9. fascia rétrovésical | 16. septum recto-vaginal |
| 3. espace prépéritonéal | 10. centre tendineux du périnée et m. recto- | 17. fascia vaginal |
| | vaginal | 18. lig. et m. ano-coccygiens |
| | | 19. m. élévateur de l'anus |

