

LA CAVITE BUCCALE

1. INTRODUCTION :

- Le tube digestif est impliqué dans la **dégradation** des aliments permettant leur **absorption** dans l'organisme ; Il comprend tous les segments anatomiques situés entre la cavité bucco-pharyngée qui le précède et le canal anal qui lui fait suite.
- La **cavité buccale** est la première partie du tube digestif, elle est garnie à l'intérieur par les dents et contient l'organe de gustation.
- La cavité buccale est destinée à la **mastication** et l'**insalivation** des aliments.
- La cavité buccale joue un rôle important dans la **phonation**.
- La cavité buccale est située dans la région céphalique en dessous des fosses nasales et des maxillaires. Elle communique avec le milieu extérieur par l'orifice oral et avec le pharynx par l'isthme du gosier.
- La cavité buccale est limitée par :
 - ✚ En avant : les lèvres
 - ✚ Latéralement : les joues
 - ✚ En haut : le palais
 - ✚ En bas : le plancher buccal
 - ✚ En arrière : l'isthme du gosier

2. DONNEES MORPHOLOGIQUES :

2.1 LES LEVRES :

Les lèvres possèdent deux versants (externe et interne) séparés par le vermillon.

2.1.1 LE VERSANT EXTERNE :

Ce versant, encore appelé **lèvre blanche**, est revêtu par un épithélium de type cutané avec ses annexes :

- ✓ Epiderme : épithélium pavimenteux stratifié kératinisé
- ✓ Dermis : tissu fibro-vasculaire renfermant les glandes sudoripares, sébacées et les follicules pileux
- ✓ Hypoderme : tissu conjonctivo-adipeux.

2.1.2 LE VERMILLON :

- ✓ Il s'agit de la région où la peau est **glabre** c.-à-d. sans poils
- ✓ Sa couleur rouge est due à l'amincissement de l'épithélium rendant visible les vaisseaux sous jacents et le muscle orbiculaire de la lèvre.

2.1.3 LE VERSANT INTERNE :

- ✓ Muqueuse buccale : épithélium **pavimenteux stratifié non kératinisé** (malpighien) reposant sur une lame basale.
- ✓ Un **chorion papillaire** sous jacent fait d'un tissu conjonctif très vascularisé ; on y trouve des infiltrats lymphoïdes et de nombreuses glandes salivaires microscopiques.
- ✓ Un tissu sous muqueux conjonctif fibro-vasculaire de support.

2.2 LES GENCIVES :

- La gencive est une **zone spécialisée** de la muqueuse buccale en relation directe avec les dents
- La gencive a un aspect rose pâle avec une consistance ferme et élastique
- La muqueuse gingivale comprend :
 - ✚ Un **épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé** (par endroit kératinisé) d'épaisseur très irrégulière
 - ✚ Un chorion comportant de nombreuses **fibres de collagène** assurant un système d'attache de la muqueuse aux plans sous jacents et **des capillaires sanguins** ainsi que des fibres nerveuses assurant la sensibilité de la gencive.

2.3 LA LANGUE :

- La langue fait saillie dans la partie moyenne du plancher de la cavité buccale
- Elle a une forme aplatie et triangulaire présentant à décrire :
 - ✚ Une partie buccale avec une **face supérieure rugueuse** et une **face inférieure lisse**
 - ✚ Une partie postérieure pharyngienne avec une surface bosselée par la présence de nombreux follicules lymphoïdes formant **l'amygdale linguale**
- La langue est un organe musculo-conjonctif formé par un muscle strié dont les faisceaux de cellules sont orientés perpendiculairement les uns aux autres.
- La langue est recouverte par une muqueuse de type buccal (**PSNK**) présentant, sur ses faces supérieure et antérieure, des différenciations appelées : **papilles**. Ces dernières confèrent à la langue un aspect rugueux.
- Les papilles sont de trois types :
 - ✚ **Papilles filiformes** : très nombreuses, réparties de façon homogène ; elles sont constituées par un axe conjonctif recouvert par un épithélium de type buccal très desquamant à ce niveau.
 - ✚ **Papilles fungiformes** : moins nombreuses, disposées entre les papilles filiformes (principalement sur les bords et la pointe de la langue). Elles ont une forme de champignon aplati avec un axe conjonctif principal qui se ramifie en axe secondaire et sur lequel repose un épithélium pouvant contenir quelques bourgeons du goût.
 - ✚ **Papilles caliciformes** : (circumvallées) Au nombre d'une douzaine disposées en arrière de la langue formant le « V » lingual ouvert antérieurement. Elles ont une forme de cylindre aplati, enchâssées dans la muqueuse délimitant un sillon circulaire : **le vallum**.
Au fond de ce vallum débouchent les canaux excréteurs des glandes salivaires de Von Ebner (séreuses).
L'axe conjonctivo-vasculaire ramifié qui les constitue est recouvert par un épithélium de type buccal renfermant de très nombreux **bourgeons du goût** localisés sur les bords internes du vallum.
- Par sa mobilité, la langue assure un rôle mécanique lors de la mastication et intervient dans la phonation.

2.4 LES DENTS :

- Les dents de lait ou définitives ont une structure histologique identique et comprennent trois parties :
 - ✚ **La couronne** : partie visible au-delà du rebord de la gencive
 - ✚ **La racine** : unique ou multiple non visible extérieurement ; Elle est encastrée dans une alvéole des maxillaires (supérieur ou inférieur) par l'intermédiaire du périodonte (fibres de collagène et élastique formant le ligament alvéolo-dentaire)
 - ✚ **Le collet** : partie légèrement rétrécie, situées entre les deux parties précédentes à laquelle adhère la gencive.

- La dent est constituée par deux éléments :

- ✚ **Une cavité centrale** : elle est constituée par la **chambre pulpaire**, prolongée dans « la » ou « les » racines par « le » ou « les » canaux dentaires s'ouvrant à l'apex des racines.

Cette cavité contient la **pulpe dentaire** (tissu conjonctif lâche avec des vaisseaux sanguins et des nerfs sensitifs) et est limitée en périphérie par une couche de cellules cylindriques appelées : **les odontoblastes**

- ✚ **La dentine ou ivoire** : c'est une substance fondamentale calcifiée produite par les odontoblastes et entourant la chambre pulpaire

- Le tissu de revêtement dentaire comprend l'**émail** qui recouvre l'**ivoire** au niveau de la couronne et le **cément** qui recouvre l'ivoire au niveau de la racine.

2.5 LES JOUES :

Les joues soumises à des étirements lors de la mastication et de la parole présentent à décrire une sous muqueuse riche en **fibres élastiques** et renfermant les **glandes jugales**.

2.6 LE PALAIS :

Le palais présente à décrire deux régions distinctes :

- **Palais dur en avant** : la muqueuse est solidement fixée au périoste des maxillaires supérieurs et des os palatins sans interposition de sous muqueuse.

Le chorion renferme les glandes palatines.

- **Palais mou en arrière** : il est soutenu par un axe conjonctif dense, l'aponévrose palatine sous – tendu par un plan musculaire.

- ✚ Sur la face buccale, au niveau du bord libre et à la partie postérieure de la face supérieure, la muqueuse est de type buccal avec un épithélium renfermant les bourgeons du goût et un chorion comportant des îlots adipeux et des glandes salivaires muqueuses.

- ✚ Le reste de la face supérieure est recouvert par un épithélium de type respiratoire reposant sur un chorion renfermant quelques glandes mixtes.

- **Le bord libre** : il porte la luvette et se poursuit par les piliers du palais.

2.6 LE PHARYNX :

- Le pharynx, en forme d'entonnoir vertical ouvert vers le haut, fait communiquer d'une part la cavité buccale avec l'œsophage et d'autre part les fosses nasales avec le larynx.
- Le pharynx est un carrefour aéro-digestif comportant trois portions : nasopharynx/ oropharynx/ laryngopharynx.
- La muqueuse est de type **respiratoire** (épithélium pseudostratifié cilié) dans la partie nasale et de type **buccal** dans les autres parties du pharynx.
- La sous muqueuse contient de nombreux follicules lymphoïdes et quelques glandes pures.
- La musculature est faite d'un tissu musculaire strié disposé en deux couches : longitudinale interne et oblique externe.

3. HISTOLOGIE :

- ◆ *La bouche sert à saisir les aliments (lèvres et dents), les broyer (mâchoires et muscles masticateurs), les lubrifier (salive) avant de permettre la déglutition (avaler).*
- ◆ *La bouche sert à respirer lorsque le nez ne peut plus le faire ; elle est alors un relais essentiel.*
- ◆ *La bouche permet la gustation grâce à papilles réceptrices linguales (bourgeons du goût) : salé, sucré, acide et amer.*
- ◆ *La bouche permet la phonation en servant de caisse de résonance et de modulation des sons.*
- ◆ *La bouche a une fonction relationnelle et émotionnelle très importante.*




FIG N°1 MUQUEUSE BUCCALE




FIG N°2 versant externe des lèvres



FIG N°3 le vermillon




FIG N° 4 le versant interne des lèvres




FIG N° 5 la langue




FIG N°6 les papilles



N° 7 la dent




FIG N° 8 Pharynx : épithélium respiratoire




FIG N° 9 Pharynx : épithélium buccal