

APPAREIL URINAIRE (suite)

La vessie

1-Introduction :

La vessie est un organe musculo-membraneux intermédiaire aux uretères et à l'urètre, elle constitue un réservoir dans lequel l'urine sécrétée d'une façon continue par les reins s'accumule et séjourne dans l'intervalle de mictions.

2-Anatomie descriptive :

Situation : dans la cavité pelvienne en arrière de la symphyse pubienne et du pubis au dessus du diaphragme pelvien, et :

- Chez l'homme : au dessus de la prostate, en avant des vésicules séminales et du rectum.
- Chez la femme : en avant de l'utérus et du vagin.

Pleine elle fait saillie dans l'abdomen.

Forme : varie selon sa réplétion,

-Vide, la vessie est aplatie de haut en bas et d'avant en arrière présente :

- Une face supérieure triangulaire et concave, à sommet antérieure se prolonge par l'ouraque
- une face postéro-inférieure ou base vésicale à sommet inférieur répondant au col et correspond à l'orifice urétral.
- Une face antéro-inférieure triangulaire à sommet supérieur se continue par l'ouraque
- trois bords : deux latéraux séparant la face supérieure de la face antéro-inférieure et un bord postérieur séparant la base de la face supérieure
- un col : se continue par l'urètre
- Un apex ou sommet ou angle antérieur se prolonge par l'ouraque(ligament ombilical médian).
- deux angles latéraux répondant à l'abouchement des deux uretères.

-Pleine :

- Les bords latéraux se distendent et deviennent des faces.
- Les face antéro-inférieure et supérieure se distendent en un aspect globuleux formant le dôme vésical ou la calotte vésicale :c'est la partie mobile ,extensible et contractile de la vessie .
- Le sommet de sa face supérieure peut remonter jusqu'à l'ombilic
- La base vésicale garde une forme sensiblement constante (le trigone vésical),

Capacité :

La capacité physiologique est d'environ 250 à 300 ml pour le besoin normal.
la capacité maximale est de 2 à 3 litres.

3-Configuration interne : elle est étudiée par la cystoscopie.

Sa paroi interne rouge est lisse chez l'enfant, aréolaire chez l'adulte Elle présente :

1-le trigone vésical : au niveau de la base de la vessie, limité par trois orifices :

-L'orifice urétral médian ,

-Les orifices urétéraux sont situés à 3cm en arrière de l'orifice urétral et sont réunis par le pli inter-urétéral .

2- le bas –fond vésical ou fosse rétro-trigonale : située derrière le trigone vésical.

3-le dôme vésical : le reste de la vessie .

4-Structure : Paroi épaisse de 8 à 15mm, présente trois tuniques :

-l'adventice qui est doublé au niveau de la face supérieure par le péritoine,

-la musculature lisse ou **détrusor** : formée par trois couches :

* Une couche superficielle : formée de fibres longitudinales.

* Une couche moyenne : fibres circulaires forment au niveau du col le sphincter lisse du col vésical.

* Une couche profonde plexiforme : formée par l'anastomose des fibres qui soulèvent la muqueuse

-- la muqueuse

5-Moyens de fixation de la vessie et loge vésicale:

-La base vésicale est fixe et solidaire à l'urètre et au plancher pelvien en plus chez l'homme la prostate.

--Les ligaments pubo-vésicaux relient la partie antérieure et inférieure de la vessie au pubis

-Accessoirement par l'ouraque et les vestiges des artères ombilicales qui se fixent sur la face postérieure de l'ombilic

--**La loge vésicale** : la vessie est contenue dans une loge , limitée par :

en avant : l'aponévrose ou fascia ombilico-prévésical

en arrière : le fascia rétro-vésical formé par l'aponévrose prostatopéritonéale de Denovilliers chez l'homme et la cloison vésico-vaginale chez la femme

Latéralement : les lames sacro-recto-genito-vesico –pubiennes

en haut : le péritoine.

6-RAPPORTS :

Face supérieure : recouverte par le péritoine et répond aux anses grêles , au colon sigmoïde.
.chez la femme : corps de l'utérus dont la sépare le cul de sac inter-vésico-utérin.

Face antéro-inférieure : la symphyse pubienne et l'espace rétro-pubien.

Face postéro-inférieure ou base :

-**Chez l'homme** : Elle présente deux segments :

-Un segment inférieur : à l'urètre et la base de la prostate.

-Un segment supérieur répond aux :

* canaux déférents , aux vésicules séminales et uretères .

* Rectum ; dont il est séparé par le cul de sac de Douglas .

Chez la femme : Le col utérin et le vagin.

7-VAISSEAUX ET NERFS :

ARTERES : -Les artères vésicales supérieures naissent des artères ombilicales et obturatrices branches des artères hypogastriques .

- Les artères vésicales inférieures : naissent des artères hypogastriques.

-Les artères vésicales antérieures naissent des artères honteuses internes branches des artères hypogastriques.

-Des rameaux des artères voisinage :

-Hémorroïdales moyennes,-Vésico-défférencielles et vésico-prostatiques chez l'homme.

-Artères utérines et vaginales longues chez la femme .

VEINES ;sont tributaires de la veine hypogastrique

-les veines antérieures se jettent dans la veine honteuse par l'intermédiaire du plexus de Santorini.

-les veines latéraux se jettent dans les veines hypogastriques.

LYMPHATIQUES :se rendent aux ganglions iliaque interne , externe et du promontoire.

NERFS ;plexus hypogastrique :

les nerfs sympathiques : responsable de la continence

Les nerfs parasympathiques proviennent des racines sacrées S2 ,S3 et S4 responsable de la miction .

-----FIN-----

Références :


H Bouvière anatomie descriptive le tronc tome 2

Alain Bouchet anatomie topographique l'abdomen petit bassin


P Kamina petit bassin et périnée

Jean Pillet anatomie du petit bassin

Femme : coupe sagittale médiane



Coupe sagittale médiane







FIG. 5.7. Moyens de fixité de la vessie chez la femme
(coupe sagittale, vue latéro-postérieure)

1. fascia ombilico-prévésical
2. lig. ombilical médian
3. fascia transversalis
4. fascia vésical
5. espace rétropubien
6. lig. pubo-vésical
7. lig. inf. du pubis
8. hiatus infrapubien
9. lig. transverse du périnée
10. membrane périnéale (fascia inf. du diaphragme uro-génital)
11. a. ombilicale droite
12. urètre droit
13. fascia rétrovésical
14. urètre
15. sphincter de l'urètre
16. m. transverse profond




FIG. 5.8. Moyens de fixité de la vessie chez l'homme
(coupe sagittale, vue antéro-latérale)

1. fascia ombilico-prévésical
2. lig. ombilical médian
3. fascia transversalis
4. fascia vésical
5. espace rétropubien
6. lig. pubo-prostatique
7. fascia prostatique
8. lig. inf. du pubis
9. hiatus infrapubien
10. lig. transverse du périnée
11. membrane périnéale (fascia inf. du diaphragme uro-génital)
12. a. ombilicale droite
13. urètre droit
14. conduit déférent droit
15. glande séminale droite
16. fascia rétrovésical
17. prostate
18. fascia rétroprostatique
19. espace rétroprostatique
20. sphincter de l'urètre
21. m. transverse profond





FIG. 5.12. Rapports postérieurs de la vessie chez l'homme (vue postérieure)

1. lig. ombilical médian
2. pli vésical transverse
3. urètre
4. conduit déférent
5. cul-de-sac recto-vésical
6. ampoule du conduit déférent gauche ouverte
7. glande séminale gauche ouverte
8. Prostate (lobe latéral)
9. fascia sup. du diaphragme uro-génital réséqué
10. glande bulbo-urétrale
11. diaphragme uro-génital






FIG. 5.13. Artères et lymphatiques de la vessie et des organes génitaux internes masculins (vue médiale et postérieure)

A. vers les lymphonœuds sacraux

1. lig. ombilical médial
2. lig. ombilical médian
3. aa. vésicales sup.
4. conduit déférent
5. urètre
6. vessie
7. a. rétrosymphysaire
8. a. vésicale ant.

9. prostate

10. urètre
11. lymphonœud obturateur
12. lymphonœuds iliaques externes médiaux
13. a. et v. iliaques externes
14. lymphonœud interiliaque
15. a. et v. iliaques internes
16. n. obturateur
17. a. ombilicale

18. lymphonœuds iliaques internes

19. a. et v. glutéales sup.
20. a. obturatrice
21. a. du conduit déférent
22. a. et v. glutéales inf.
23. a. vésicale inf.
24. a. rectale moyenne
25. a. pudendale interne
26. glande séminale




FIG. 5.14. Artères et lymphatiques de la vessie chez la femme (vue médiale et postérieure)

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| A. vers les lymphonœuds sacraux | 8. a. vésicale ant. | 17. a. ombilicale |
| 1. lig. ombilical médial | 9. urètre | 18. lymphonœuds iliaques internes |
| 2. lig. ombilical médian | 10. vagin | 19. a. et v. glutéales sup. |
| 3. aa. vésicales sup. | 11. lymphonœud obturateur | 20. a. obturatrice |
| 4. urètre | 12. lymphonœud iliaque externe médial | 21. a. utérine |
| 5. a. vésico-vaginale | 13. a. et v. iliaques externes | 22. a. et v. glutéales inf. |
| 6. vessie | 14. lymphonœud interiliaque | 23. aa. vaginales |
| 7. a. rétrosymphysaire | 15. a. et v. iliaques internes | 24. a. rectale moyenne |
| | 16. n. obturateur | 25. a. pudendale interne |