

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Université de Constantine 3

Faculté de médecine CHU de Constantine

Laboratoire d'Anatomie

Cours pour étudiants de deuxième année de médecine

L'Urètre

Elaboré par le Dr DOUS SAID

L'urètre est un conduit musculo-membraneux qui assure l'excrétion des urines. Il est aussi chez l'homme la voie d'excrétion du sperme.

L'urètre masculin

Morphologie :

Origine: fait suite au col de la vessie, sur la ligne médiane à 3cm de la symphyse pubienne.

Trajet: l'urètre est formé par deux parties principales:

- l'urètre postérieur: comprend deux segments;
 - ✓ L'urètre prostatique: traverse verticalement la prostate.
 - ✓ L'urètre membraneux : oblique en bas et en avant; traverse le diaphragme uro-génital.
- l'urètre antérieur (Spongieux): Il va du bulbe spongieux à l'extrémité du gland.

Dimensions:

- Longueur : 16 cm quand la verge est à l'état de flaccidité.
- Calibre: 9 mm en moyenne.
- Il présente trois dilatations:
 - ✓ Le sinus prostatique
 - ✓ Le cul-de-sac bulbaire
 - ✓ La fosse naviculaire
- Il présente quatre zones rétrécies :
 - ✓ L'ostium interne
 - ✓ L'urètre membraneux
 - ✓ Le segment spongieux moyen
 - ✓ L'ostium externe

Configuration interne :


L'urètre prostatique : présente une saillie médiane et postérieure le véru montanum dont l'extrémité supérieure se prolonge par les deux freins du véru délimitant la fossette prostatique, l'extrémité inférieure se prolonge par la crête urétrale. Les gouttières latérales bordent le véru où s'y

ouvrent les canaux excréteurs de la prostate. Sur la ligne médiane s'ouvrent l'utricule prostatique et les canaux éjaculateurs.

2- l'urètre membraneux : présent des plis longitudinaux.

3- l'urètre spongieux : présente aussi des plis longitudinaux,

- présente des dépressions, les lacunes urétrales dans lesquelles s'ouvrent les glandes urétrales.
- au niveau du gland, l'urètre se dilate pour former la fossette naviculaire, à 2cm du méat existe la valvule de Guérin (valvule de la fossette naviculaire)




Rapports :

L'urètre prostatique est entouré du sphincter lisse de l'urètre, il entre en rapport avec les lobes de la prostate, l'utricule prostatique et les canaux éjaculateurs.

L'urètre membraneux traverse le périnée antérieur, comprenant à ce niveau le sphincter strié de l'urètre et l'aponévrose moyenne du périnée.

L'urètre spongieux passe au dessous de l'aponévrose moyenne du périnée et pénètre dans le corps spongieux qui l'entoure sur toute sa longueur.



Vaisseaux et nerfs :

Les artères :

- L'urètre prostatique par les branches de l'artère iliaque interne destinées à la prostate:
 - ✓ Hémorroïdales moyennes
 - ✓ Prostatiques
 - ✓ Vésicales inférieures
- Le reste de l'urètre est vascularisé par les branches de la honteuse interne.

Les veines: se jettent dans la veine dorsale de la verge, le plexus de Santorini et le plexus séminal.

Drainage lymphatique: Les collecteurs lymphatiques de l'urètre sont tributaires:

- ✓ Des collecteurs de la prostate pour la partie prostatique.
- ✓ Des nœuds iliaques internes et externes pour la partie membranacée.
- ✓ Des nœuds iliaques externes et inguinaux pour la partie spongieuse.

Les nerfs : plexus hypogastrique et nerf honteux interne.

L'urètre féminin

Il s'étend depuis le col de la vessie jusqu'à la vulve.

Morphologie extérieure : L'urètre est souple et élastique, très dilatable, de 7 à 8 mm de diamètre pour une longueur de 3 à 4 cm, dont 2 à 3 cm pour le segment pelvien et 1cm pour le segment périnéal.

Direction, sensiblement verticale, avec une légère courbure à concavité antérieure


Morphologie intérieure : La surface intérieure de l'urètre est de coloration rougeâtre. Sa muqueuse présente des plis longitudinaux qui s'effacent lors de sa distension.

Structure : Epaisse de 5 à 6 mm, la paroi comprend trois tuniques :

- Une musculuse, faite de fibres musculaires lisses

- Une sous muqueuse, faite de tissus cellulaire lâche contenant des éléments vasculaires en particulier veineux
- Une muqueuse, renfermant d'importantes glandes péri-urétrales.

COUPE SAGITTALE MEDIANE DU PETIT BASSIN CHEZ LA FEMME




Rapports

Urètre pelvien, répond

- En avant, à l'espace rétro-symphysaire contenant des éléments veineux constituant les plexus veineux de Santorini, ces derniers reçoivent la veine dorsale du clitoris, ainsi que l'artère graisseuse et les artères rétro-symphysaire branche de la honteuse interne.
- En arrière, à la paroi antérieure du vagin
- Latéralement, aux muscles releveurs de l'anus qui s'unissent entre eux sur la ligne médiane.

Urètre périnéale, segment très court de 1 cm de long sur un calibre de 7 à 8 mm.

Il traverse la partie toute antérieure du périnée antérieure, entourée du sphincter externe de l'urètre, ensuite l'aponévrose périnéale moyenne et s'ouvre par le méat urétral, celui-ci est de 3 à 4 mm de diamètre situé à 2 cm en arrière du clitoris. Dans son trajet périnéal, il est croisé latéralement par les deux corps caverneux du clitoris et par la partie antérieure des bulbes vestibulaires. Il est solidaire de l'orifice inférieur du vagin à laquelle il est uni par la cloison uréthro-vaginale.



Vascularisation et innervation

Les artères : La vascularisation artérielle est assurée par des rameaux de l'artère vaginale longue, des artères cervico- et vésico-vaginales et par l'artère vésicale inférieure, branche de l'hypogastrique et accessoirement par l'artère vésicale antérieure venue de la honteuse interne.

Les veines se drainent dans les veines rétro-symphysaire (plexus veineux de Santorini) qui se jettent dans les veines honteuses internes.

Les lymphatiques se rendent aux ganglions de la chaîne iliaque externe.

L'innervation nerf honteux interne.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE.

KAMIN.P anatomie gynécologique et obstétricale, 3eme Edition. Maloine. Paris 1979.

Petit bassin et périnée organes génitaux tome2 édition Maloine1995

ROUVIERE.H Anatomie Humaine. Descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome 2. TRONC. 13eme Edition. Masson. PARIS 1991

BOUCHET.A , CUILLERET.J. Anatomie. Descriptive, topographique et fonctionnelle. L'abdomen, la région rétro-péritonéale, le petit bassin et le périnée. Simep 1983.