

LES GLANDES SURRENALES

I- Introduction.

- Les glandes surrénales sont des glandes endocrines paires, indispensables à la vie.
- Elles sont situées sur l'extrémité supérieure du rein correspondant, dans la région rétropéritonéale.
- Elles sont constituées de deux parties embryologiquement différentes, la corticosurrénale d'origine mésodermique et la médullo-surrénale d'origine ectoblastique.
- Leurs dysfonctionnements sont à l'origine en particulier de la maladie d'Addison, du syndrome de Cushing, et de la maladie de Conn.

II- Anatomie descriptive

1- Situation

Elles sont situées dans l'espace rétro péritonéal de la cavité abdominale, dans le fascia rénal à hauteur de T12. La surrénale droite est plus bas située que la surrénale gauche.

2-Forme

La glande surrénales sont aplaties , la surrénale droite est pyramidale ; la gauche a la forme d'une virgule inversée.

3- Couleur consistance et dimensions

De couleur jaune brun, de consistance ferme.

Longueur : 5 cm, largeur : 3 cm, épaisseur 1 cm sur le bord externe et diminue graduellement pour atteindre 3 à 4 mm sur le bord interne.

Poids : 5 grammes.

4- Configuration extérieure

La surrénale droite


Triangulaire possédant trois faces

- face antérieure : présente le hile
- face postérieure concave
- face rénale : repose sur le pôle supérieur du rein
- bord latéral et un bord médial

La surrénale gauche

En forme de virgule inversée possédant :

- face postérieure ou dorsale, une face antérieure ou ventrale présentant le hile
- Une extrémité caudale, large
- Une extrémité crâniale effilée
- Deux bords, latéral s'appuie sur le rein et médial.




Les glandes surrénales. Vue antérieure

4- Configuration intérieure

Entourées d'une capsule fibreuse propre, elles présentent :

- une partie périphérique, jaunâtre : le cortex qui sécrète les minéralocorticoïdes et glucocorticoïdes, ainsi que les androgènes.
- La médulla : centrale, rouge foncé, elle sécrète des hormones qui agissent sur le l'appareil cardio-vasculaire : les catécholamines (adrénaline, noradrénaline).



III- Moyens de fixité :

La glande surrénale est contenue dans la loge rénale, séparée d'elle par le fascia inter-surrénorénal.

IV-Rapports

1-Rapports antérieurs

La glande surrénale droite

-la veine cave inférieure

-Le foie

La glande surrénale gauche

-Le corps du pancréas


-L'estomac

2-Rapports postérieurs


-Diaphragme

-Récessus pleural costo-diaphragmatique

-les deux dernières cotes



COUPE HORIZONTAL PASSANT PAR T12



3-Rapports latéraux

-Le bord médial du rein, au-dessus du pédicule rénal


4-Rapports médiaux

La glande surrénale droite

-la veine cave inférieure

La glande surrénale gauche

-L'aorte abdominale



IV- Vascularisation et innervation

1- les artères

- artère surrénale supérieure : Provient de l'artère phrénique inférieure.
- artère surrénale moyenne : Provient directement de l'aorte
- artère surrénale inférieure : Provient directement de l'artère rénale homolatérale

2- les veines

Le plexus veineux de la médulla est drainé dans les veines centrales puis dans la veine surrénale qui émerge du hile.

La veine surrénale droite : se jette dans la VCI

La veine surrénale gauche : se jette dans la veine rénale

3-lymphatiques : Ils se drainent dans les nœuds latéro-aortiques droit ou gauche.

4- Les nerfs : ils constituent le plexus surrénal qui provient du plexus cœliaque, des nerfs grands splanchnique et phrénique.

