

Appareil génital de la femme

Les ovaires

I-Introduction

Les ovaires sont les organes producteurs des ovules et sont également des glandes à sécrétion interne (endocrines).

II-Anatomie descriptive :

-Situation ;

Au nombre de deux, l'un droit, l'autre gauche, les ovaires sont placés dans la cavité pelvienne, en arrière des ligaments larges et contre la paroi latérale de la cavité pelvienne.

-Forme et aspect : l'ovaire a une forme d'un ovoïde légèrement aplati de dehors en dedans dont le grand axe est vertical chez la nullipare, présente à décrire deux faces, deux bords et deux extrémités. Chez la multipare : Oblique en bas et en dedans.

Aspect : --lisse et régulier avant la puberté,

--irrégulier par les saillies formées par les follicules vésiculaires de l'ovaire et de cicatrices consécutives à la rupture de ces follicules.

--Après la ménopause : diminue de volume (atrophie) et redevient lisse et régulier.

Dimensions : 4cm de hauteur, 2cm de largeur et 1cm d'épaisseur. Poids 6 à 8 g.

Consistance et couleur : de consistance ferme et de couleur blanc rosée .

Description : présente à décrire deux faces :latérale et médiale ,

deux bords :-antérieur mésovarique c'est le hile de l'ovaire et la zone de réflexion du péritoine

-postérieur : libre

Deux extrémités ou pôles :supérieure tubaire et inférieure utérine.

III-Moyens de fixité et peritonisation :

l'ovaire est dépourvu de péritoine et sa surface extérieure est réellement située dans la cavité péritonéale .Le péritoine s'interrompt au niveau du bord antérieur.

l'ovaire est maintenu en place par :

1-le mésovarium : court méso ,dont les deux feuillets se fixent au niveau du bord antérieur de l'ovaire relie l'ovaire au ligament large .

2-Le ligament utéro-ovarien ou ligament propre de l'ovaire : est un cordon de fibres musculaires lisses qui relie l'extrémité inférieure de l'ovaire à la corne utérine.

3- le ligament tubo-ovarien : faisceau conjonctif et musculaire lisse reliant l'extrémité supérieure de l'ovaire au pavillon de la trompe .

4-Le ligament lombo-ovarien ou ligament suspenseur de l'ovaire : le plus solide, formé de Fibres conjonctifs et musculaires lisses qui accompagnent les vaisseaux ovariens depuis la région lombaire et qui se termine au niveau de l'extrémité supérieure de l'ovaire.

IV-Rapports : l'ovaire est presque entièrement libre et nu dans la cavité péritonéale, les ovaires sont en rapport avec les organes de voisinage par l'intermédiaire de la cavité péritonéale.

1-La face latérale :

Chez la nullipare :cette face est appliquée sur le péritoine de la paroi latérale de la cavité pelvienne ,dans une dépression appelée fossette ovarique de Krause

Cette fossette ovarique est limitée par :

En haut et en arrière par la bifurcation des vaisseaux iliaques,

En bas :l'artère utérine ,

En avant et en bas : le feuillet postérieur du ligament large .

par l'intermédiaire de cette fosse ,il entre en rapport avec l'artère ombilicale,le nerf et vaisseaux obturateurs .

Chez la multipare :cette face repose dans une autre dépression de la paroi pelvienne située au dessous et en arrière de la précédente c'est la fossette sous ovarique de (CLAUDIUS).

2-la face médiale : recouverte par le pavillon de la trompe et par le méso-salpinx .

3-Le bord antérieur :donne attache au mésovarium qui unit l'ovaire au ligament large qui circonscrit sur ce bord le hile de l'ovaire .

4-le bord postérieur est libre répond :

-chez la nullipare :à l'uretère et aux vaisseaux hypogastriques.

-Chez la multipare :à la paroi postérieure de la cavité pelvienne.

5-L'extrémité supérieure : donne attache aux ligaments :lombo-ovarien ,tubo-ovarien

6--L'extrémité inférieure : donne attache au ligament utéro-ovarien.

V-Structure :deux parties :

périphérique la corticale ou cortex et une centrale : la médullaire lieu d'activité hormonale et endocrine ,

l'ovaire est recouvert d'un épithélium superficiel .

VI- Vaisseaux et nerfs :

-Les artères :par les artères ovariennes et les artères utérines .

a-Les artères ovariennes :au nombre de deux ,naissent de la face antérieure de l'aorte abdominale au niveau de L2 ,Accompagnent les ligaments lombo-ovariens et croisent les urètres (au niveau de L3)

-Elles se terminent au niveau de l'extrémité tubaire de l'ovaire en donnant :

-L'artère ovarienne latérale : qui s'anastomose avec la branche de l'artère utérine.

-L'artère tubaire latérale .

b-Les artères utérines : chaque artère utérine donne l'artère ovarienne médiale qui s'anastomose avec l'artère ovarienne latérale branche de l'artère ovarienne .

--Les veines :forment un plexus veineux complexe au niveau de l'ovaire deviennent satellites des artères et rejoignent :

-les veines utérines qui se jettent dans les veines hypogastriques .

-les veines ovariennes qui se jettent :

À droite la veine cave inférieure,

A gauche la veine rénale gauche.

--les lymphatiques : satellites de l'artère ovarienne et rejoignent les nœuds latéro-aortiques au niveau de L2.


--Nerfs : proviennent du plexus hypogastrique.



Références :

Alain Bouchet 4abdomen petit bassin,la region rétropéritonéale ,

H Rouvière Anatomie descriptive du tronc tome 2 ,

P Kamina petit bassin et périnée tome 2.





Ovaire et trompe utérine (vue ventrale)

Coupe horizontale du petit bassin

Figure 1

- 1- Fascia ombilico-prévésical
- 2- Artère ombilicale
- 3- Vessie
- 4- Ligament rond
- 5- Ilum
- 6- Uterus
- 7- Mésovarium
- 8- Ovaire
- 9- Mésomètre
- 10- Muscle obturateur interne
- 11- Symphyse pubienne
- 12- Pubis

