

LA GLANDE PROSTATIQUE

DR AMRANE CHAFIKA YASMINA

Cours destiné aux étudiants de deuxième année de médecine

ANNEE UNIVERSITAIRE 2023/2024

OBJECTIFS

Connaitre la situation de la glande prostatique

Connaitre la morphologie externe de la glande

Décrire la loge prostatique

Décrire la constitution interne de la glande prostatique.

Décrire les rapports de la glande à l'intérieure de la loge et en dehors de la loge Prostatique.

Plan d'étude :

I- INTRODUCTION :

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE :

1- Situation :

2- Forme :

3- Couleur :

4- Consistance :

5- Poids

6- Dimension chez l'adulte :

7- Description :

8- La constitution interne :

9- Les moyens de fixité :

III- RAPPORTS DE LA PROSTATE :

IV- VASCULARISATION DE LA PROSTATE :

I- INTRODUCTION :

La glande prostatique est une masse glandulaire impaire, médiane, située dans la cavité pelvienne au niveau du carrefour formé par l'urètre et les voies spermatiques.




Fig 1- Situation générale de la prostate

1- vésicule séminale. 2- Prostate. 3- Urètre. 4- Canal déférent

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE :

1- Situation :

Elle est située :

- au dessous de la vessie
- au dessus du plancher périnéal
- en avant du rectum entre les muscles élévateurs de l'anus de Chaprête
- en arrière de la symphyse pubienne.

2- Forme :

Elle a une forme d'une châtaigne ou d'un cône aplati d'avant en arrière, à sommet inférieur, son axe est oblique en bas et en avant.

3- Couleur :

Blanchâtre ou gris blanchâtre ou rose pâle.

4- Consistance :

Ferme et régulière, plus endurée chez les sujets âgés, facile à apprécier par le toucher rectal.

5- Poids : 20 à 25 g.

6- Dimension chez l'adulte :

- Hauteur : 30mm
- Largeur : 40 mm
- Epaisseur : 25 mm

7- Description :

On lui décrit 4 faces, une base, 1 sommet.

- Les faces se distinguent en :
 - Antérieure : plane et verticale
 - Postérieure : plus oblique, plus convexe avec une dépression médiane la divisant en 2 lobes latéraux.
 - 2 faces latérales : larges et arrondies.
- La base ou face supérieure : divisée par un bourrelet saillant, transversal en :
 - Versant antérieur urétro-vésical
 - Versant postérieur, génital : présente une gorge transversale dans laquelle s'enfoncent les vésicules séminales et les canaux déférents qui convergent pour former les canaux éjaculateur.
- Le sommet ou bec de la prostate, arrondi d'avant en arrière et répond à l'émergence de l'urètre.




Fig 2- Morphologie, dimension et poids de la prostate

III- La constitution interne :

La prostate est entièrement enveloppée d'une capsule conjonctive, mince et adhérente qui envoie en profondeur de nombreuses cloisons entre les lobules qui se rassemblent en un certain nombre de masses glandulaires formant « les lobes prostatiques ». Plusieurs canaux la traversent tels que l'urètre et les canaux éjaculateurs.

Les lobes se différencient de façon classique en :

- 1 lobe antérieur, pré-urétral : il est réduit.
- 2 lobes latéraux : en arrière de l'urètre, en arrière des voies spermatiques.
- 1 lobe médian : ou pré-spermatique, situé en avant des canaux éjaculateurs.

Les lobes glandulaires sont formés par 30 à 40 glandes prostatiques.




Fig 3- Constitution interne de la prostate

1- Vésicule séminale. 2- Canal déférent. 3- Canal éjaculateur. 4- Prostate
 5- Veru-montanum ou colliculus séminal. 6- sphincter strie. 7- Utricule.
 8- Muscle Détrusor

a- urètre intr-mural. b- Urètre prostatique. C- Urètre membraneux

IV- Les moyens de fixité :

La prostate est maintenue en place par :

- Son adhérence avec la base de la vessie.
- La traversée de l'urètre et des voies spermatiques.
- Ses connexions avec la paroi de la loge prostatique

V- RAPPORTS DE LA PROSTATE :

Les rapports de la prostate doivent être étudiés :

- A l'intérieur de la loge
- A l'extérieur de la loge.

a- La loge de la prostate :

La prostate est contenue dans une loge dont les parois cellulo-fibreuses sont constituées par :

- En avant : le fascia pré-prostatique qui se termine en haut dans les ligaments pubo-prostatiques et en bas le ligament transverse du pelvis.
- En arrière : aponévrose prostatopéritonéale de Denonvilliers
- Latéralement : les lames sacro recto-génito-pubiennes sa partie antérieure et basse.
- En haut : la vessie et par le tissu conjonctif fibreux qui unit cet organe à la base de la prostate.
- En bas : le plan moyen du périnée.

b- Rapports de la prostate à l'intérieur de la loge prostatique :

La prostate entre en rapport avec :

- La portion prostatique de l'urètre
- Le muscle sphincter lisse de l'urètre.
- La partie supérieure péri-prostatique du muscle sphincter, strié de l'urètre
- Les éléments veineux péri-prostatiques représentés par la convergence des veines vésicales antérieure et dorsale de la verge. Cette convergence forme le plexus de Santorini

c- Par l'intermédiaire de la loge prostatique, la prostate entre en rapport avec :

- En avant :
 - La partie inférieure de la symphyse pubienne
 - Une vessie rétro-symphysaire
 - Une ou 2 veines graisseuses
 - Des artères graisseuses et rétro-symphysaire (branches collatérales de l'artère honteuse interne)
 - Le plexus de Santorini
 - Le muscle sphincter de l'urètre
 - Quelques veines pré-prostatiques
- Latéralement : Le muscle releveur de l'anus.

- En arrière : le rectum, les vésicules séminales, la terminaison des déférents et les pédicules vasculo-nerveux.
- En haut : la vessie, la terminaison des voies spermatiques (vésicules séminales et ampoules déférentielle).
- En bas : entouré par le sphincter strié de l'urètre, répond au cap du rectum et au plan moyen du périnée




Fig 4- Les rapports de la prostate

1- Péritoine. 2- Vessie. 3- Rectum. 4- prostate. 5- Aponévrose prostato-péritonéal de Denonvilliers. 6- Plancher périnée. 7- Aponévrose pré-prostatique. 8- Espace de Retzius. 9- Aponévrose ombilico prévésical. 10- Vésicule séminale. 11- CSD Recto-vésical.

VI- VASCULARISATION DE LA PROSTATE :

1- La vascularisation artérielle :

Elle est sous la dépendance de l'artère hypogastrique et assurée par les artères suivants qui sont des branches du tronc antérieur de l'hypogastrique.

a. L'artère vésicale inférieure :

Donne habituellement :

- Une ou plusieurs branches vésico-prostatiques qui pénètrent la base de la prostate.
- Des branches prostatiques qui parcourent les faces latérales et postérieures de la prostate.

b. L'artère honteuse interne :

Participe à la vascularisation

c. L'artère rectale moyenne :

Participe accessoirement à la vascularisation de la prostate.




Fig 5- Vascularisation artérielle de la prostate

- 1- Artère hypogastrique (iliaque interne). 2- Artère vésico-prostatique
3- Artère vésicale inférieure. 4- Artère rectale moyenne.

5- Artère pudendale. 6- Artère prostatique. 7- Prostate. 8- Vessie

2- La vascularisation veineuse :

Les veines se jettent en avant et latéralement dans le plexus veineux prostatique de Santorini et en arrière dans le plexus séminal ; tout le sang de ces plexus est conduit par les veines vésicales à la veine iliaque interne.

3- La vascularisation lymphatique :

Les collecteurs lymphatiques de la glande prostatique accompagnent les vaisseaux et se distinguent en 4 pédicules :

- Pédicule iliaque externe : tributaire d'un nœud lymphatique iliaque externe sous veineux.
- Pédicule iliaque interne : longe l'artère prostatique jusqu'à un ganglion hypogastrique.
- Pédicule postérieur : se termine soit dans un ganglion situé en dedans du 2^e trou sacré, soit dans les ganglions du promontoire.
- Pédicule inférieur : descend de la face antérieure de la prostate gagne l'artère honteuse interne et se termine dans un ganglion iliaque interne.

N.B : Les lymphatiques de la prostate sont largement anastomosés à ceux de la vessie, de l'ampoule déférentielle, des vésicules séminales et du rectum.

4- INNERVATION :

Les nerfs de la prostate viennent du plexus hypogastrique.

Conclusion

La prostate est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin.

Elle a plus ou moins la taille et la forme d'une châtaigne. Elle se situe directement sous la vessie cette position explique les problèmes urinaire de la prostate, en avant du rectum et entoure le début de l'urètre. Elle se compose de nombreuses glandes, de tissu conjonctif et de fibres musculaires. La prostate a pour principale fonction de produire le liquide spermatique, qui assure la mobilité des spermatozoïdes. Elle est essentielles au bon fonctionnement des spermatozoïdes, et donc à la fertilité de l'homme.

Université Salah Boubnider Constantine 3
Faculté de médecine. Département de médecine.
Laboratoire d'anatomie humaine.

L'hypertrophie ou hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) est extrêmement répandue, tandis que l'inflammation de la prostate (prostatite) et le cancer de la prostate (carcinome) sont beaucoup plus rares.

Références Bibliographique

- 1- Rouvière H, Delmas A. Anatomie descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome 2. Ed Masson 2006: 625-28
- 2- Fritsch H, Kuhnel w. Atlas d'Anatomie. Tome 2. 4^{ème} éd Flammarion. 2007 : 258.
- 3- Seisena T, Roupréta M, Faixb A, Droupye S. La prostate : une glande au carrefour uro-génital. Progrès en urologie 2012 ; (22): 2-6
- 4http://unf3s.cerimes.fr/media/paces/Grenoble_1112/chaffanjon_philippe/chaffanjon_philippe_p22/chaffanjon_philippe.
- 5-http://clg-blois-begon-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-blois-begon-blois/IMG/pdf/L_APPAREIL_REPRODUCTEUR_de_l_homme.pdf
- 6- Kamina P. Petit bassin et périnée organes génitaux. Tome 2^{ème} éd. Maloine 1995.
- 7- Chevalier JM. Anatomie tronc. 2^{ème} éd. Médecine science publication 2011.