

Anatomie de la verge

I-Introduction

La verge ou pénis est l'organe de la copulation et de la miction chez l'homme. Il est fixé devant la symphyse pubienne, pendant devant les bourses à l'état de repos. Il est constitué de formations érectiles entourées d'une enveloppe cutanée commune, le fourreau. La verge est parcourue par l'urètre qui s'ouvre à son extrémité distale par le méat urétral.

II. Configuration extérieure

La verge comprend deux parties distinctes du point de vue topographique et fonctionnel :

- La racine, cachée dans le périnée et fixe ;
- Le corps, visible et mobile.

A. La racine de la verge

Située dans l'espace superficiel du périnée, au-dessus du scrotum. Elle comprend les deux piliers et le bulbe de la verge.

1. Les piliers de la verge



- Ils représentent les parties postérieures des corps caverneux.
- Chaque pilier se fixe sur une branche ischio-pubienne en avant de la tubérosité ischiatique, et sur le fascia inférieur du diaphragme uro-génital.
- Entourés par le muscle ischio-caverneux.

2. Le bulbe de la verge :

- Représente la partie postérieure du corps spongieux.
- Se fixe sur la face inférieure de la membrane périnéale.
- Il est recouvert du muscle bulbo spongieux.
- Il est piriforme et médian.
- Il est traversé sur sa face profonde, à 1 ou 2 cm de son extrémité postérieure par l'urètre, et plus latéralement, par les conduits des glandes bulbo-urétrales.

B. Le corps de la verge

Il est situé, à l'état flaccide, sous la symphyse pubienne devant le scrotum, et à l'état d'érection, devant la symphyse pubienne.



III- La forme et dimensions

-La forme cylindrique plus ou moins aplati sagittalement avec une face antérieure ou dos du pénis, une face postérieure ou face urétrale, et une extrémité libre renflée, le gland.

-Les dimensions sont très variable chez l'adulte, le corps mesure :

- À l'état de flaccidité : 10 à 12 cm de longueur et 8 à 9 cm de circonférence
- A l'état d'érection : 16 à 18 cm de longueur de 11 à 12 cm de circonférence.

VI- Constitution de la verge

La verge est constituée schématiquement de trois cylindres de tissu érectile : 2 corps caverneux et 1 corps spongieux, formés par un tissu aréolaire qui, lorsqu'il se remplit de sang, entraîne l'érection.

- le corps spongieux présente à son extrémité distale un renflement, le gland.
- Ces corps érectiles, isolés dans la racine, se regroupent sous le pubis pour participer à la formation du corps de la verge.

1. Les corps caverneux

-latéraux, pairs et symétriques, plaqués en arrière contre les branches ischiopubiennes - recouvert par les muscles ischio-caverneux qui les fixent,
-d'abord séparés à leur origine, ils se rejoignent pour former deux sillons(gouttières) longitudinaux :


- L'un, supérieur pour la veine dorsale profonde du pénis, sur le dos de la verge.
- L'autre, inférieur pour le corps spongieux, sur la face urétrale.

2. Le corps spongieux

-Prend naissance en arrière au niveau du bulbe. Il se continue en avant par le gland.
-Il entoure l'urètre spongieux et chemine dans la gouttière longitudinale inférieure des corps caverneux.
-L'urètre pénètre le corps spongieux au niveau de la face supérieure du bulbe.

3. Le gland

-Extrémité libre du pénis, il est recouvert du prépuce.
-Il est conique, lisse et d'une couleur rosée.
-Sa base forme un bourrelet circulaire, plus saillant au niveau du dos du pénis, la couronne du gland. Celle-ci est séparée de l'insertion du prépuce par un sillon circulaire, le col du gland.
-Son sommet est percé d'une fente sagittale de 7 mm environ, l'ostium externe de l'urètre.
-Sa face urétrale présente un sillon médian unissant le col et l'ostium urétral externe ; il donne insertion au Frein du prépuce.




V- Les enveloppes de la verge

-Une albuginée épaisse qui entoure chacun des corps érectiles.
-Le fascia profond du pénis, qui entoure un espace cellulaire important qui explique les possibilités de "glissement" du fourreau sur les formations érectiles.

Anatomie de la verge. Pr Benleghib N

- Le dartos (fascia superficiel du pénis).
- La peau ou fourreau de la verge.



VI-Vascularisation

1- Artères

- Profondes, toutes provenant de l'artère Pudendale (honteuse) interne, branche de l'iliaque interne qui donne les artères caverneuses, l'artère bulbo-urétrale, les artères dorsales de la verge ou(pénis).
- Superficielles, provenant de l'artère Pudendale (honteuse) externe, branche de l'artère fémorale, destinées au fourreau de la verge.

2- Veines

- la veine dorsale profonde du pénis, draine les formations érectiles, va se drainer dans les veines iliaques.
- la veine dorsale superficielle du pénis, pour le fourreau, va se drainer dans la grande veine saphène.

3-Lymphatiques : nœuds inguinaux et iliaques externes

VII- Nerfs

Provenant :

- du système sympathique, c'est à dire du plexus hypogastrique.
- du système cérébro-spinal : ce sont des branches du nerf pudendal interne, provenant du plexus sacré

