

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université de Constantine 3
Faculté de médecine CHU de Constantine
Laboratoire d'Anatomie
Cours pour étudiants de deuxième année de médecine dentaire
Les muscles masticateurs
Elaboré par le Pr BOUKABACHE Leila

I- Introduction

Les muscles masticateurs constituent l'appareil moteur de la mandibule. Ils servent à la mastication et sont pairs et symétriques. On distingue deux groupes :

- Les muscles élévateurs et diducteurs de la mandibule : ils sont communément appelés masticateurs, ils s'insèrent d'une part sur le crâne et d'autre part sur la mandibule. Ce sont : le masséter, le temporal, le ptérygoïdien latéral et le ptérygoïdien médial, ils sont tous innervés par des branches du nerf mandibulaire (V3). Ils sont tous vascularisés par des rameaux provenant soit des branches collatérales de l'artère carotide externe, soit par des rameaux provenant des branches terminales de l'artère carotide externe.
- Les muscles abaisseurs de la mandibule jouant un rôle secondaire dans la mastication, les muscles abaisseurs sont au nombre de trois : mylohyoïdien ; géniohyoïdien ; digastrique (ventre antérieur).

D'autre part selon la disposition des muscles masticateurs par rapport à la branche de la mandibule et l'orientation de leurs fibres musculaires on les classe en :

- les muscles masticateurs latéraux : ils sont situés en dehors de l'articulation temporo-mandibulaire, leurs fibres musculaires sont orientées verticalement d'où en découle la fonction qui est l'élévation de la mandibule. Ce sont le muscle masséter et le temporal.
- les muscles masticateurs médiales : ils sont situés en dedans de l'articulation temporo-mandibulaire, leurs fibres musculaires sont orientées obliquement ou transversalement, d'où en découle la fonction qui est la diduction (mouvement de latéralité). Ce sont le ptérygoïdien latéral et le ptérygoïdien médial

II- Anatomie descriptive

A- Les muscles élévateurs et diducteurs de la mandibule

1- Le muscle masséter

De forme quadrilatère, court et épais c'est un muscle superficiel de la face, appliqué sur la face latérale de la branche mandibulaire, jusqu'à l'arcade zygomatique.

Il est constitué de 2 couches musculaires

- La couche superficielle

Origine : elle se fixe par une large lame tendineuse sur le bord inférieur de l'os zygomatique.

Terminaison : Une faible partie de ses fibres charnues se fixent sur l'angle mandibulaire et la majeure partie se fixent sur la face latérale de la lame tendineuse de la couche profonde.

- La couche profonde est totalement recouverte par la couche superficielle.

Origine : sur le bord inférieur de l'arcade zygomatique

Terminaison ; Elle se fixe sur l'angle mandibulaire, et sur la couche superficielle.

Fonction : la contraction du masséter provoque la fermeture de la cavité orale par le mouvement d'élévation de la mandibule.

2- Le muscle temporal

Muscle large et plat, occupant toute la fosse temporale, il s'étale en éventail du processus coronoïde de la mandibule à la fosse temporale du crâne.

Ses insertions sont osseuses et aponévrotiques.

- insertion aponévrotique ; Il s'insère sur la face profonde du fascia temporal qui est tendue de la ligne temporale supérieure au processus zygomatique.
- insertion osseuse ; sur les os du crâne à savoir :
 - les facettes temporales, de la grande aile du sphénoïde et de l'os frontal
 - l'écaille du temporal.
- partie inférieure du pariétal.

Il présente deux faisceaux ; - **antérieur** dont les fibres sont verticales descendantes

- **postérieur** : dont les fibres sont plus horizontales, orientées vers le bas et l'avant.

Fonction : sa contraction provoque la fermeture de la cavité orale par le mouvement d'élévation, la contraction de ses fibres postérieures provoque la rétropulsion de la mandibule.

3- Le muscle ptérygoïdien latéral

Il constitue avec le ptérygoïdien médial le plan profond des muscles élévateurs et diducteurs (mouvement de latéralité) de la mandibule.

C'est un muscle de petite taille, conique tendu de l'apophyse ptérygoïde au col de la mandibule.

Il est formé de deux faisceaux

- **un faisceau supérieur** : il s'attache sur la grande aile du sphénoïde et sur l'apophyse ptérygoïde
- **un faisceau inférieur** : il s'insère sur la lame latérale de l'apophyse ptérygoïde et sur la tubérosité maxillaire.

Les deux faisceaux se terminent sur le col de la mandibule et la capsule de l'articulation temporo-mandibulaire.

Action : Sa contraction bilatérale provoque la propulsion de la mandibule et sa contraction unilatérale avec le ptérygoïdien médial homolatéral provoque la diduction de la mandibule.

4- Le muscle ptérygoïdien médial

C'est un muscle épais, quadrilatère, situé en dedans du muscle ptérygoïdien latéral. Il présente deux faisceaux : superficiel et profond

Origine :

Fosse ptérygoïde, lame latérale de l'apophyse ptérygoïde, processus pyramidal de l'os palatin.

Terminaison : la face médiale de l'angle de la mandibule, et au niveau de la tubérosité ptérygoïdienne de la face médiale de la branche mandibulaire.

Action



Elévateur de la mandibule (contraction bilatérale)

Diducteur de la mandibule (contraction unilatérale)

B- Les muscles abaisseurs de la mandibule

Ils forment les muscles du plancher buccal, ils appartiennent aux muscles supra-hyoïdiens. Ils sont en plus des muscles élévateurs de l'os hyoïde Ce sont :

- Le muscle mylo-hyoïdien, innervé par le V.
- Le ventre antérieur du muscle digastrique, innervé par le V
- Le Géniohyoïdien, à l'intérieur et au-dessus du muscle mylo-hyoïdien .Innervé par le XII.



. Références

Chevalier JM, Bonfils P. ORL 2^{ème} éd. Médecine-Sciences Flammarion Paris 2001

Rouvière H, Delmas A. Anatomie Humaine descriptive, topographique et fonctionnelle tome1 éd. Masson Paris 1986

Kamina P Anatomie clinique tête et cou éd. Maloine Paris 2007