

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université 3Constantine Salah Boubnider .
Faculté de médecine CHU Constantine.
Laboratoire d'Anatomie générale.
Cours pour étudiants de la deuxième année de médecine
Fait par DR BOUSBA 023/024

LES MUSCLES PEUCIERS DE LA FACE

I-INTRODUCTION :

Les muscles peauciers (cutanés) de la face se caractérisent par :

- Ont une insertion cutanée mobile.
- Ils sont innervés par le nerf facial.
- Ils sont groupés autour des orifices de la face et sont constricteurs et dilatateurs de ces orifices.
- Fonction d'expression du visage (la mimique) .

Ils se répartissent en quatre groupes :

- 1°-Les muscles des paupières et des sourcils ,
- 2°-Les muscles de l'auricule (pavillon de l'oreille),
- 3°-Les muscles du nez ,
- 4°-Les muscles des lèvres ou de la bouche auxquels nous rattacherons le muscle peaucier du cou.

II-ANATOMIE DESCRIPTIVE :

A-Muscles des paupières et des sourcils :

Les muscles qui agissent sur les paupières et les sourcils sont : le muscle occipito-frontal, le muscle procérus (pyramidal) , le muscle orbiculaire des paupières et le corrugateur du sourcil (sourcilier).

1-Le muscle occipito-frontal : est un muscle digastrique, plat mince, formé de deux ventres : les muscles occipitaux en arrière et les muscles frontaux en avant séparés sur la ligne médiane par l'aponévrose épicroticienne (galéa aponévrotique).

a -Le muscle occipital : il naît par de courtes fibres aponévrotiques de la ligne courbe occipitale supérieure et de la partie mastoïdienne du temporal et se termine sur l'aponévrose épicroticienne.

b-Le muscle frontal :

Il naît du bord antérieur de l'aponévrose épicroticienne, les fibres charnues descendent et s'attachent à la face profonde de la peau des régions sourcilières et inter sourcilière.

- Le muscle occipito-frontal mobilise le cuir chevelu dans le sens antéropostérieur et élévateur des sourcils .

-Donne toutes les rides horizontales du front. (émotion d'étonnement)

2-Le muscle procérus (pyramidal) : ce sont deux petits faisceaux charnus, grêles, allongés sur la partie supérieure du dos du nez de chaque côté de la ligne médiane.

-Se termine sur la face profonde de la peau de la région inter sourcilière.

-Abaisse la peau de la région inter sourcilière, donne la dureté du regard (agressivité).

3-Le muscle orbiculaire de l'œil ou des paupières

Muscle mince dont les fibres concentriques s'enroulent autour de l'orifice palpébral.

Formé de deux parties , palpébrale et orbitaire.

origine : Partie médiale du processus frontal de l'os maxillaire,

Terminaison : -Portion palpébrale: peau des paupières

-Portion orbitaire : peau de l'orbite.

-Responsable de l'occlusion des paupières et favorise l'écoulement de larme

4-Le muscle corrugateur du sourcil (sourcilier) : muscle grêle étendu de l'extrémité interne de l'arcade sourcilière à la peau du sourcil, rapproche les sourcils en déterminant les rides verticales.

B-Muscles de l'auricule (pavillon de l'oreille)

S'étendent du pavillon de l'oreille aux régions voisines, ce sont très minces et disposés pour être dilatateurs du conduit auditif externe et orientateurs de l'auricule.

Trois muscles auriculaires **antérieur, postérieur et supérieur.**

C-Les muscles du nez : trois muscles qui sont,

1-le muscle transverse du nez (partie transverse du muscle nasal) :

Muscle mince, étendu transversalement sur la partie moyenne du nez, depuis le dos de cet organe jusqu'à la fosse canine, il est dilatateur des narines.

2-Le muscle dilatateur des narines :

C'est un petit muscle dans l'épaisseur de l'aile du nez, il porte l'aile du nez en dehors et augmente ainsi le diamètre transversal des narines.

3-le muscle myrtilforme ou abaisseur du septum nasal:

C'est un muscle aplati, étendu de la fossette myrtilforme de l'os maxillaire au bord postérieur des narines. il abaisse l'aile du nez et rétrécit transversalement l'orifice des narines.

D-Les muscles de la bouche ou des lèvres :

Se répartissent en deux groupes : les dilatateurs et les constricteurs.

I-les muscles dilatateurs : se sont de haut en bas :

1-Les muscles releveur superficiel et profond de l'aile du nez et de la lèvre supérieure :

a-le muscle releveur superficiel :

Muscle mince allongé dans le sillon naso-génien depuis le rebord interne de l'orbite jusqu'à la lèvre supérieure. il attire en haut l'aile du nez et la lèvre supérieure.

b-le muscle releveur profond ;

muscle aplati, mince, large et recouvert en partie par le releveur superficiel, il s'étend du rebord de l'orbite à la lèvre supérieure.

Son action se confond avec celle du muscle releveur superficiel.

2-le muscle releveur de l'angle de la bouche (canin) : s'étend de la fosse canine à l'angle de la bouche, il élève la commissure et la lèvre supérieure (muscle de la menace).

3 -les muscles petit et grand zygomatique :

Il s'insèrent sur la face externe de l'os zygomatique et se terminent en bas sur la face profonde de la peau de la lèvre supérieure et l'angle de la bouche.

ils attirent en haut et en dehors la lèvre supérieure.

4-le muscle buccinateur : placé à la partie profonde de la joue entre l'os maxillaire et l'os mandibule et se termine sur la commissure des lèvres.

Attire l'angle de la bouche en arrière et latéralement,

Intervient dans l'action de souffler, la mastication et donne à la joue sa tonicité.

5-le muscle risorius : mince étendu sur la partie moyenne de la joue à la commissure des lèvres.

Il attire en dehors et en arrière la commissure des lèvres, muscle du sourire.

6-muscle abaisseur de l'angle de la bouche:

Muscle mince, large, triangulaire, étendu entre la mâchoire inférieure et la commissure des lèvres.

Exprime la tristesse.

7-le muscle abaisseur de la lèvre inférieure:

Muscle aplati, quadrilatère, situé sur la partie latérale du menton et de la lèvre inférieure.

Attire en bas et en dehors la lèvre inférieure, muscle du dégoût.

8-le muscle mentonnier : sont deux petits faisceaux situés de part et d'autre de la ligne médiane du corps de l'os mandibule et se termine sur la peau de la région mentonnière

Ils sont élévateurs du menton et de la lèvre inférieure et participe à la mastication..

9-le muscle platysma (peaucier du cou) :

Muscle large mince recouvre la région antérolatérale du cou et la partie inférieure de la face, s'étend du thorax à l'os mandibule et la joue.

Abaisse et étire la commissure des lèvres, exprime la frayeur.

II-les muscles constricteurs :

1-Le muscle orbiculaire des lèvres :

Origine : muscles de la région, os maxillaire, mandibule sur la ligne médiane.

Terminaison : tissu sous-cutané des lèvres, forme une ellipse autour de la bouche.

Fonction : fermeture de la bouche, projection des lèvres en avant et rôle important pour la parole et la mastication.

2--le muscle compresseur des lèvres : faisceaux musculaires étendus autour de l'orifice buccal et à travers les fibres de l'orbiculaire des lèvres , de la face profonde de la peau à la muqueuse ;
Il est développé chez le nouveau né et joue un rôle important dans la succion.

-----Fin-----

Références :

1-Rouvière H .ANATOMIE HUMAINE .Tome 1 tête et cou .

2-P.KAMINA ",tête et cou tome 1.

3--G COULY :Anatomie maxillo-faciale



