

LES ARTERES DE LA TÊTE ET DU COU

I-INTRODUCTION

Les artères de la tête et du cou proviennent des artères carotides communes et des artères subclavières. Le système carotidien joue un rôle très important. Il assure la vascularisation artérielle de la majeure partie de la face du cou et du cerveau.

II- LES ARTERES CAROTIDES COMMUNES OU PRIMITIVES

Au nombre de deux droite et gauche. Ce sont les artères principales du cou, de la face et de la partie antérieure du cerveau.

A- L'ARTERE CAROTIDE COMMUNE DROITE

- **Origine** : naît à la base du cou de la bifurcation du tronc brachio-céphalique,
- **Trajet** : monte dans la région antérieure du cou jusqu'à sa terminaison.
- **Dimension** : 7 à 12mm du diamètre (9mm en moyenne), 12 cm de long présente à sa partie terminale une dilatation c'est le sinus carotidien.

B- L'ARTERE CAROTIDE COMMUNE GAUCHE

- **Origine** : naît dans le thorax de la partie horizontale de la crosse de l'aorte.
- **Trajet** : présente un court trajet intra-thoracique (plus longue que la droite de 3 cm) Gagne la base du cou puis monte dans le cou comme la droite.
- **Dimension** : 7 à 12 mm de diamètre (9mm en moyenne), 15 cm de long présente à sa partie terminale une dilatation c'est le sinus carotidien.

C- TERMINAISON DES ARTERES CAROTIDES COMMUNES

Chacune de ces deux carotides droite et gauche se termine à 1 cm au-dessus du bord supérieur du cartilage thyroïde en donnant deux branches terminales :

- ✓ l'artère carotide externe,
- ✓ l'artère carotide interne.

D- RAPPORTS DES ARTERES CAROTIDES COMMUNES

1- Dans le thorax : Seule y chemine l'artère carotide commune gauche qui répond :

- En avant, à la veine brachio-céphalique gauche et au thymus
- En arrière, à l'œsophage, au nerf laryngé inférieur, à l'artère subclavière gauche, et au conduit thoracique.
- À droite, au tronc artériel brachio-céphalique et à la trachée.
- À gauche, aux nerfs, vague et phrénique gauches, et à la plèvre.

2- Dans le cou : répond :

- En avant, au muscle sterno-cléido-mastoïdien et au muscle omohyoïdien ;
- En arrière, à l'artère thyroïdienne inférieure et aux muscles pré-vertébraux,
- Médialement, à la trachée, à l'œsophage, au larynx et au lobe thyroïdien.
- Latéralement, au nerf vague et à la veine jugulaire interne.

3- Une même gaine vasculaire carotidienne de chaque côté ; entoure la veine jugulaire interne, l'artère carotide primitive et le nerf vague placé en arrière des deux vaisseaux. Au contact de la gaine vasculaire cheminent la chaîne lymphatique jugulaire.

E- BRANCHES TERMINALES

L'artère carotide externe et l'artère carotide interne.

1- Artère carotide externe :

Branche terminale de l'artère carotide commune. Elle irrigue les régions antérieures du cou, la face et les téguments de la tête.

a- Origine : S'étend de la bifurcation de l'artère carotide commune jusqu'à 4 à 5 cm au-dessus de l'angle de la mandibule où elle se divise en ses deux branches terminales.

b- Dimensions : 7cm de long, 8 mm de diamètre, dilatée à son origine (sinus carotidien).

c- Trajet et rapports : Monte verticalement sur une longueur de 2cm, puis se porte en haut et latéralement pour se redresser de nouveau jusqu'à sa terminaison, elle présente deux parties cervicale et céphalique.

- **La Partie cervicale** est en rapport avec :

- En arrière : la carotide interne.
- En dehors : le tronc veineux thyro-linguo-facial, le nerf hypoglosse et le muscle sterno-cléido-mastoïdien.
- En dedans : le pharynx.

- **La Partie céphalique** : l'artère pénètre dans la glande parotide où elle se termine.

d- Terminaison : Se termine dans la glande parotide.

e- Branches collatérales :

L'artère thyroïdienne supérieure, l'artère linguale, l'artère cervicale ascendante, l'artère faciale, l'artère occipitale, l'artère auriculaire postérieure et un Rameaux parodiens.

f- Branches terminales :

- ✓ Artère temporale superficielle.
- ✓ Artère maxillaire : c'est l'artère profonde de la face.

1- Artère carotide interne :

Elle vascularise l'encéphale, l'œil et l'oreille.

- **Origine** : A 1 cm au-dessus du bord supérieur du cartilage thyroïde. 12cm de long, 8mm de calibre.

- **Trajet** : présente quatre parties

- ✓ *Partie cervicale* : l'artère est entourée par la gaine carotidienne avec la veine jugulaire interne et le nerf vague.
- ✓ *Partie pétreuse* : traverse le canal carotidien du rocher.
- ✓ *Partie caverneuse* : traverse le sinus caverneux.
- ✓ *Partie cérébrale* : située en dehors du nerf optique (II).

- **Terminaison** : Au niveau de la base du cerveau, en se divisant en deux branches.

- **Branches collatérales** : Les plus importantes sont :

L'artère ophtalmique, l'artère hypophysaire supérieure, l'artère choroïdienne antérieure, l'artère communicante postérieure

- **Branches terminales :**

- ✓ Artère cérébrale antérieure.
- ✓ Artère cérébrale moyenne (sylvienne).

III- ARTÈRES SUBCLAVIÈRES

- **Origine** :





- ✓ A droite : naît du tronc brachio-céphalique.
- ✓ A gauche : naît de la crosse de l'aorte.

- **Trajet** : elle passe entre les muscles scalènes antérieur et moyen décrivant trois parties ; pré-scalénique, inter-scalénique et post-scalénique.

- **Terminaison** : au-dessous de la partie moyenne de la clavicule en se continuant par l'artère axillaire.

- **Branches collatérales :**

- ✓ Artère vertébrale.
- ✓ Artère thoracique interne.
- ✓ Tronc thyro-cervical (tronc thyro-bicervico-scapulaire) qui donne les artères ; thyroïdienne inférieure, cervicale ascendante, cervicale transverse superficielle et supra-scapulaire.
- ✓ Tronc costo-cervical qui donne les artères ; cervicale profonde et intercostale suprême.
- ✓ Artère scapulaire dorsale



- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. lame superficielle du fascia cervical | 8. platysma | 16. n. laryngé récurrent | 22. trachée |
| 2. vv. thyroïdiennes inf. | 9. m. omo-hyoïdien | 17. parathyroïde inf. | 23. a. v. thyroïdiennes inf. |
| 3. m. sterno-hyoïdien | 10. lymphonœuds jugulaires latéraux | 18. r. cardiaques sup. | 24. racine sup. de l'anse cervicale |
| 4. m. sterno-thyroïdien | 11. m. scalène ant. | 19. ganglion cervical moyen, a. thyroïdienne inf. | 25. a. carotide commune |
| 5. v. jugulaire ant. | 12. a. vertébrale | 20. n. phrénique et lame prévertébrale | 26. v. jugulaire int. |
| 6. lig. thyro-trachéal lat. | 13. m. long du cou | 21. lame prétrachéale musculaire | 27. n. vague |
| 7. m. sterno-cléido-mastoidien | 14. espace rétro-œsophagien | | |
| | 15. œsophage | | |

