

LES VEINES DE LA TÊTE ET DU COU

I-INTRODUCTION

- Le sang veineux cérébral est déversé de chaque côté dans les veines jugulaires internes droite et gauche. Ces dernières ont pour origine les sinus veineux de la dure-mère.
- Les veines jugulaires internes reçoivent également le sang de la région orbitaire, d'une partie de la face et de la plus grande partie de la région antérieure du cou.
- Le sang veineux du cou est drainé de chaque côté par les veines jugulaires : interne, externes, antérieure, postérieure, et thyroïdiennes inférieures.
- Les veines vertébrales et jugulaires postérieures drainent la colonne vertébrale cervicale et la nuque.

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE :

A- La veine jugulaire interne :

C'est la plus volumineuse veine du cou, drainant le sang veineux de la cavité crânienne, de la région orbitaire, d'une partie de la face et de la plus grande partie de la région antérieure du cou. Son calibre est de 10 mm, sa longueur est d'environ 15 cm, elle présente à sa terminaison deux valvules ostiales.

1- Origine : Elle débute au niveau du foramen jugulaire (trou déchiré postérieur) où elle fait suite au sinus latéral.

2- Trajet : Elle descend dans le cou à l'intérieur de la gaine vasculaire, jusqu'en arrière de l'extrémité médiale de la clavicule où elle se termine.

3- Terminaison : Elle termine en s'unissant à la veine subclavière pour former la veine brachio-céphalique (le tronc veineux brachio-céphalique).

4- Branches d'origine de la veine jugulaire interne :

Ce sont les sinus crâniens, ceux-ci reçoivent toutes les veines des organes contenus dans la cavité crânienne (encéphale et méninges) et de la cavité orbitaire (œil et annexes).

5- Les branches collatérales de la veine jugulaire interne :

- Prés de la base du crâne elle reçoit : le sinus pétreux inférieur, le sinus pétro-occipital, le sinus carotidien, la veine condylienne antérieure et quelques veines pharyngiennes.

- Au cou au voisinage de l'os hyoïde elle reçoit : les veines faciales, linguales, thyroïdienne supérieure, le plus souvent ces veines s'ouvrent dans la veine jugulaire interne par un tronc commun thyro-lingo-facial, la veine pharyngienne inférieure et la thyroïdienne moyenne.

B- La veine jugulaire externe :

C'est une volumineuse veine, elle draine le sang des régions superficielles de la tête, les régions profondes de la face et les plans superficiels des régions postérieure et latérale du cou. Calibre est de 5mm elle présente à sa terminaison deux paires de valvules.

1. Origine : Elle naît dans l'épaisseur de la glande parotide, par la réunion des veines temporale superficielle et maxillaire interne.

2. Trajet : Elle descend obliquement en bas et en arrière, traversant la glande parotide où elle est placée en dehors de l'artère carotide externe et croisée en dehors par le nerf facial, puis passe sur la face latérale du muscle sterno-cléido-mastoïdien, enfin elle est dans la région sus-

claviculaire, où elle s'infléchit en dedans et en bas et s'ouvre sur la face supérieure de la veine subclavière.

3. Branches collatérales :

Elle reçoit les veines auriculaires postérieures, occipitales, plusieurs rameaux cervicaux sous-cutanés, la veine supra-scapulaire, la veine transverse du cou et des rameaux musculaires.

C. La veine jugulaire antérieure

Elle draine une partie du sang des régions antérieures du cou.

1. Origine : Elle résulte de la réunion dans la région sus-hyoïdienne de plusieurs petites veines sous-mentales superficielles

2. Trajet : Elle descend à la face antérieure du cou en dehors de la ligne médiane jusqu'au voisinage de l'incisure jugulaire du sternum (fourchette sternale), elle se coude ensuite à angle droit et se porte transversalement en dehors jusqu'à sa terminaison dans la veine subclavière.

3. Branches collatérales : Elle reçoit des rameaux provenant des téguments et des muscles voisins et l'arcade veineuse jugulaire qui l'unit à la veine du côté opposé.

D. La veine vertébrale :

Les veines vertébrales et jugulaires postérieures sont les principales voies d'écoulement des plexus veineux intra et extra-rachidiens de la région cervicale.

1. Origine : elle résulte de la réunion de plusieurs veines du plexus veineux suboccipital

2. Trajet : elle gagne obliquement le trou transversaire de l'atlas, descend à travers les trous transversaires des six premières vertèbres cervicales, sur le côté latéral du trou artériel.

3. Terminaison : elle se jette dans la veine brachio-céphalique, au-dessous et en arrière de la veine jugulaire interne.

4. Branches collatérales : elle reçoit : les veines vertébrale antérieure, musculaire et cervicale profonde ; elle s'anastomose avec les veines spinales.

E. La veine jugulaire postérieure :

Elle est extra rachidienne, elle est profondément située dans la nuque.

1. Origine : naît du plexus sub-occipital

2. Trajet : elle descend obliquement entre les muscles semi-épineux du cou et le semi-épineux de la tête. Elle s'infléchit ensuite latéralement jusqu'à sa terminaison.

3. Terminaison : elle se termine dans le confluent veineux jugulo-subclavier.

4. Branches collatérales : elle reçoit les veines de la nuque.

F. Les veines thyroïdiennes inférieures :

Elles naissent en nombre variable de la partie inférieure du corps thyroïde, elles descendent en avant de la trachée et s'anastomosent entre elles et se réunissent en un ou deux troncs principaux qui se jettent dans la veine brachio-céphalique gauche.

G. La veine subclavière :

Elle fait suite à la veine axillaire et s'unit à la veine jugulaire interne pour constituer la veine brachio-céphalique correspondante. Elle commence en avant de l'artère subclavière, en regard du bord inférieur du muscle subclavier et se termine en arrière de l'articulation sternoclaviculaire, elle possède à chacune de ses extrémités une paire de valvules.

- **Branches collatérales :** elle reçoit sur sa face supérieure les veines jugulaires externe et antérieure, elle reçoit également, les veines pectorales, scapulaire dorsale, et vertébrale. A sa terminaison, elle reçoit à gauche le conduit thoracique et à droite le conduit lymphatique droit.

