

LES LYMPHATIQUES DE LA TÊTE ET DU COU

I-INTRODUCTION

Tous les organes à l'exception du cerveau, possèdent un système de réseau lymphatique parallèle aux veines. Ce système constitue une véritable barrière protectrice contre les infections en provenance du nez, du pharynx, ou de la cavité buccale. De plus il joue le rôle de filtre sur le trajet des cellules tumorales des voies aéro-digestives supérieures. Cette circulation comporte de nombreux nœuds largement anastomosés entre eux comme dans tous les lymphocentres.

II- LES LYMPHOCENTRES :

Les vaisseaux lymphatiques de la tête rejoignent les lymphocentres de la tête qui se drainent dans les lymphocentres du cou.

Ceux-ci sont en fin évacués par les troncs jugulaires dans le conduit lymphatique à droite, et dans le conduit thoracique à gauche.

A- LYMPHOCENTRES DE LA TÊTE

Ils sont regroupés en cercle à la jonction de la tête et du cou (cercle de Poirier et Cunéo).

Tous se drainent dans les nœuds cervicaux profonds. Ces lymphonœuds sont au nombre de 6 principaux. Représentés par :

a- Lymphonœuds occipitaux : drainent la région occipitale.

b- Lymphonœuds mastoïdiens : drainent la région temporo-pariétale et les oreilles.

c- Lymphonœuds sub-mandibulaires : Ce sont les nœuds les plus importants de cette région. Ils drainent la région infra-orbitaire, la joue, la langue et la gencive.

d- Lymphonœuds parotidiens : Ils drainent le plan cutané latéral, paupières, peau de la région zygomatique, et le front. Drainent aussi les oreilles et le palais mou.

e- Lymphonœuds buccaux (ou faciaux) : On peut en distinguer quatre :

Le lymphonœud buccinateur (sur le muscle, le lymphonœud naso-labial, le lymphonœud zygomatique, le lymphonœud mandibulaire. Ils drainent les paupières, le nez et La muqueuse buccale.

f- Lymphonœuds sub-mentaux : Ils drainent la lèvre inférieure, le menton et l'apex de La langue.

B- LYMPHOCENTRES DU COU

Cinq Groupes lymphatiques :

- Nœuds cervicaux antérieurs superficiels et profonds.
- Nœuds cervicaux latéraux superficiels et profonds.
- Nœuds rétro-pharyngiens.

1- Nœuds cervicaux antérieurs superficiels ou ganglions jugulaires antérieurs : Situés le long de la veine jugulaire interne. Ils drainent la région antérieure du cou.

2- Nœuds cervicaux antérieurs profonds :

- ✓ Nœuds pré-laryngés.
- ✓ Nœuds thyroïdiens.
- ✓ Nœuds para-trachéaux (ganglions de la chaîne récurrentielle).
- ✓ Nœuds pré-trachéaux.

3- Nœuds cervicaux latéraux superficiels ou ganglions jugulaires externes : Situés le long de la veine jugulaire externe, ils drainent la parotide, l'oreille et la région cervicale latérale.

4- Nœuds cervicaux latéraux profonds

- ✓ Nœuds jugulaires.
- ✓ Nœuds spinaux.
- ✓ Nœuds cervicaux transverses.
- ✓ Nœuds supra-claviculaires.

5- Nœuds rétro-pharyngiens : Drainent le nasopharynx la trompe auditive et les articulations vertébrales cervicales.

LES LYMPHOCENTRES DE LA TÊTE

- **Nœuds occipitaux.**
- **Nœuds mastoïdiens (rétro-auriculaires).**
- **Nœuds parotidiens.**
- **Nœuds faciaux.**
- **Nœuds submandibulaire (sous-maxillaires).**
- **Nœuds submentaux (génien).**





FIG. 17.1. Nœuds lymphatiques superficiels du cou et de la face

1. nœuds parotidiens superf.
 2. nœuds infra-auriculaires
 3. nœud rétro-auriculaire
 4. nœud occipital
 5. nœud cervical superficiel sup.
 6. nœuds cervicaux superficiels moyens, v. jugulaire ext.
 7. m. sterno-cléido-mastoïdien
 8. nœuds supra-claviculaires
 9. nœuds naso-labiaux
 10. nœud zygomatique
 11. nœud buccinateur
 12. nœuds mandibulaires
 13. nœuds submentaux
 14. nœuds submandibulaires
 15. nœud jugulo-digastrique
 16. nœuds cervicaux ant. superficiels, v. jugulaire ant.
 17. nœuds axillaires apicaux
- } **Nœuds faciaux**



Nœuds cervicaux antérieurs profonds

- **Nœuds pré-laryngés.**
- **Nœuds thyroïdiens.**
- **Nœuds para-trachéaux (ganglions de la chaîne récurrentielle).**
- **Nœuds pré-trachéaux.**

