

LE CERVELET

I-Introduction :

Le cervelet est la partie la plus volumineuse du métencéphale, Situé dans la loge crânienne postérieure, en arrière du bulbe et de la protubérance, au dessous des hémisphères cérébraux dont il est séparé par la tente du cervelet.

Il assure la régulation du tonus musculaire, de l'équilibre et la coordination des mouvements.

II-Anatomie descriptive : Allongé transversalement et aplati de haut en bas, mesure :

10 cm de large ,5 cm de hauteur et 6 cm dans le sens antéropostérieur.

La surface du cervelet est marquée par des sillons, les fissures cérébelleuses qui délimitent les lamelles cérébelleuses.

Présente à décrire trois faces : antérieure, supérieure et inférieure.

Les faces supérieure et inférieure sont séparées par la fissure horizontale et sont recouvertes par les méninges .

1-Face supérieure :

-Présente sur la ligne médiane une saillie allongée d'avant en arrière appelée **vermis supérieur** , de chaque côté du vermis : la face supérieure des hémisphères cérébelleux.
elle répond à la tente du cervelet.

2-Face inférieure :

Présente sur la ligne médiane **la grande scissure du cervelet** au fond de laquelle proémine **le vermis inférieur** .

De part et d'autre du vermis inférieur cette face est convexe des hémisphères cérébelleux.

-Elle repose sur les fosses cérébelleuses de l'os occipital

3-Face antérieure :

Occupée par un prolongement en cul de sac du 4^{ème} ventricule que circonscrivent les différentes formations qui unissent le cervelet au tronc cérébral.

Ce prolongement est limité par :

1*-en haut : l'extrémité antérieure du vermis supérieur et par une membrane nerveuse, la valvule de Vieussens ou **voile médullaire supérieur**.

2*En bas et sur la ligne médiane :par l'extrémité antérieure du vermis inférieure ou **nodule**

3-En bas et de chaque côté du nodule, par les valvules ou membranes de Tarin ou **voile médullaire inférieur**

4-sur les côtés par les pédoncules cérébelleux.

Les valvules de tarin sont deux minces lamelles blanches étendues transversalement des côtés du nodule à l'extrémité interne du lobule du pneumogastrique ou flocculus

-Leur bord antérieur se continue avec la membrana tectoria.

III-Division de la surface du cervelet :

La surface du cervelet est parcourue par un grand nombre de sillons dirigés transversalement sur les vermis supérieur et inférieurs, courbe sur les hémisphères.

Ces sillons de profondeur différente divisant le cervelet en lobes ,lobules ,lames et lamelles

-trois lobes :

Le lobe antérieur ou Paléo-cérébellum :contrôle le tonus musculaire(position debout.. ..)

Le lobe postérieur ou Néo-cérébellum : Coordination des mouvements volontaires.

Le lobe flocculo-nodulaire ou Archéo-cérébellum : composé du nodule sur le vermis et des flocculus latéralement : Contrôle l'équilibration .

IV-Les pédoncules cérébelleux :

1-Les pédoncules cérébelleux supérieurs :rejoignent les parties postéro-latérales du mésencéphale et limitent latéralement le versant supérieur du toit du 4eme ventricule.

Les bords médiaux convergent et s'unissent en haut ,le voile médullaire supérieur (valvule de Vieussens) les unit .

Les pédoncules cérébelleux moyens : les plus volumineux prolongent les parties postéro-latérales du pont .

Les pédoncules cérébelleux inférieurs : minces prolongent la partie postéro-latérales du bulbe .

V-Configuration interne :

1-**La substance grise** :constituée de deux parties une couche corticale et des noyaux gris centraux

La couche corticale : mince recouvre toute la substance cérébelleuse , interrompu au niveau des pédoncules cérébelleux et des valvules de Vieussens et de Tarin .

-**Noyaux gris centraux** au nombre de 4 : noyaux dentelés (olives cérébelleuses),

noyaux dentelés accessoires externes (bouchon, embolus),

noyaux dentelés accessoires internes (noyaux globuleux)

noyaux du toit (fastigial).

2-**La substance blanche** : recouverte par la couche corticale, entoure les noyaux gris centraux .

Elle émet dans l'épaisseur des lobules, des lames et des lamelles des prolongements branchés les uns sur les autres .Le vermis présente sur une coupe une disposition arborescente d'où le nom d'arbre de vie.


-----FIN-----

Références :


H.Rouvière –A.Delmas anatomie descriptive –membre et système nerveux central tome 3

P Kamina tome 5


G.Braillon le système nerveux central .







i. Vue latérale gauche du cerveau.



**CERVELET
FACE SUPERIEURE**







Coupe transversale au niveau du pédoncule cérébelleux supérieur