


NERFS OCULOMOTEURS

Dr Dous

Innervation et action des muscles extrinsèques de l'œil : vue antérieure



PLAN


I/ INTRODUCTION

II/ANATOMIE DESCRIPTIVE


- 1/ Origines réelle et apparente
- 2/ Trajet, terminaison, rapports
 - a/ Etage postérieur de la base du crane
 - b/ Étage moyen de la base du crane
 - c/ La fente sphénoïdale
 - d/ La cavité orbitaire
- 3/ Branches terminales et collatérales

I/ Introduction :


- En raison de leur fonction synergique sur la musculature du globe oculaire, les IIIème, IVème et VIème nerfs crâniens doivent faire l'objet d'une étude d'ensemble. Il s'agit en effet des nerfs strictement moteurs, destinés aux musculatures extrinsèques et intrinsèques de l'œil.




Vue supérieure



Innervation et action des muscles extrinsèques de l'œil : vue antérieure




Vue latérale droite



II/ Anatomie descriptive :


2/ Origine apparente :

- a/ Moteur oculaire commun III : Le III prend son origine apparente à la face interne du pédoncule cérébral.
- b/ Pathétique (trochléaire) IV : le seul nerf crânien émergeant à la face postérieure de l'isthme de l'encéphale.
- c/ Moteur oculaire externe (Abducens) VI : son origine apparente est le sillon bulbo-pontique au-dessus de la pyramide antérieure du bulbe.



1/ Origine réelle :



- a/ Moteur oculaire commun III étage pédonculaire, plusieurs noyaux moteurs dont un principal, et un noyau végétatif, le noyau pupillaire tenant sous sa dépendance la contraction de l'iris.
- b/ Pathétique (trochléaire) IV : un seul noyau moteur d'origine mésencéphalique.
- c/ Moteur oculaire externe (Abducens) VI : possède deux noyaux moteurs l'un principal l'autre accessoire de Pacotti.





3/ Trajet, terminaison, rapports :

a/ Etages postérieur et moyen de la base du crane :

- - Moteur oculaire commun III : circule sous la face ventrale du pédoncule cérébral, puis il pénètre dans le toit du sinus caverneux.
- - Pathétique (trochléaire) IV : d'abord rétro-pédonculaire puis pré-pédonculaire et passe ensuite dans la paroi latérale du sinus caverneux.
- - Moteur oculaire externe (Abducens) VI : placé entre le pont et la gouttière basilaire, croise la face postérieure du rocher.





b/ La fente sphénoïdale :

- Elle a la forme de virgule a grosse extrémité inféro-interne, et à fine extrémité supéro-externe contenant dans :

- - Sa patrie interne arrondie

⋮

- - Le nerf nasal en dedans.


- - Le VI en dehors.

- - Branche supérieure du III en haut


- - Branche inférieure du III en bas

- - Sa partie externe effilée : de dehors en dedans on a les nerfs : lacrymal, frontal, pathétique.


Orbite droite : vue frontale et légèrement latérale



Insertions musculaires et nerfs et vaisseaux pénétrant dans l'orbite




Vue supérieure




c/ La cavité orbitaire:


Innervation et action des muscles extrinsèques de l'œil : vue antérieure







Vue latérale droite




Vue supérieure




c/ La cavité orbitaire:



Coupe frontale du bulbe de l'œil :
vue postérieure du segment antérieur





MERCI