

**LE NERF FACIAL ET L'INTERMEDIAIRE DE WRISBERG.****I- INTRODUCTION :**

Le nerf facial (VII nerf crânien), es un nerf mixte constitué par un nerf moteur ; c'est le facial proprement dit et par un nerf sensitif, c'est l'intermédiaire de Wrisberg sur le trajet duquel existe un renflement ganglionnaire appelé ganglion géniculé.

Le nerf facial innerve les muscles peauciers de la face et du cou, le muscle Stylo-hyoïdien, le ventre postérieur du digastrique et le muscle de l'étrier. L'intermédiaire de Wrisberg fournit l'innervation sensitive du conduit auditif externe et l'innervation gustative des 2/3 antérieurs de la langue.

Le nerf facial possède des fibres neuro-végétatives qui régissent la sécrétion muco-nasale, lacrymale et salivaire.

**II- ANATOMIE DESCRIPTIVE :****1- Origine :**

Il naît par 7 racines qui émergent de la partie latérale du sillon ponto-bulbaire, le nerf intermédiaire de Wrisberg est plus grêle est situé plus en dehors entre le VII et VIII.


**2- Trajet :**

Dans l'étage postérieur du crâne, il est oblique en haut et en avant.

Par le méat acoustique interne, il pénètre dans le rocher.

Dans l'aqueduc de Fallope, son trajet en baïonnette comprend plusieurs segments :

- Labyrinthique, oblique en avant, en dehors, perpendiculaire à l'axe du rocher.
- Premier coude où les 2 racines fusionnent et où se trouve le ganglion géniculé, (4mm).
- Tympanique : oblique en dehors en arrière, parallèle à l'axe du rocher (10 mm).
- .2° coude.
- .Mastoïdien vertical (10 à 12 mm).
- .Par le trou stylo-mastoïdien le nerf sort u rocher.
- .Dans la parotide, il se termine par 2 branches terminales.



### **III- Les rapports :**

#### 1- Dans l'étage postérieur du crâne :

Le facial est solidaire du nerf vestibulo-cochléaire (VIII) qui est au-dessous et un peu en dehors, l'intermédiaire de Wrisberg est situé entre les 2 nerfs. A son origine le nerf facial est surcroisé par l'artère cérébelleuse supérieure, puis il surcroiser le sinus pétreux inférieur.

#### 2- Dans le méat acoustique interne :

Le nerf facial repose sur le nerf vestibulo-cochléaire, l'intermédiaire de Wrisberg étant entre les 2 nerfs.

#### 3- Dans l'aqueduc de Fallope (canal facial) :

*Le nerf Facial Pr Amrane CY*

a- La partie labyrinthique : il passe entre la cochlée en avant et le vestibule en arrière, puis il se coude en arrière suivant un angle de 60° à 70° pour former le genou du nerf facial, à ce niveau se trouve le ganglion géniculé qui est triangulaire.


b- La partie tympanique : elle est située entre le conduit semi-circulaire latéral, en haut et la fenêtré du vestibule en bas.

c- La partie mastoïdienne : elle est accompagnée de l'artère stylo-mastoïdienne et entourée de cellules mastoïdienne. Elle répond :

- En dedans à la fosse jugulaire
- En avant aux parois postérieures de la caisse du tympan et du méat acoustique externe.


#### 4- A la sortie du foramen stylo-mastoïdienne :

Le nerf facial passe entre les muscles, digastrique et le Stylo-hyoïdien pour pénétrer dans la parotide.



#### 5- Dans la parotide :


Il croise la face externe de la veine jugulaire externe et se divise en 2 branches de la temporo-faciale et la cervico-faciale qui partagent la parotide en 2 parties, superficielle et profonde.



#### IV- LES BRANCHES COLLATERALES :

##### A- BRANCHES INTRA-PETREUSES :


1. Le nerf grand pétreux : Il naît du genou du nerf facial, chemine dans le canal du nerf grand pétreux.
2. Le rameau : Communicant avec le nerf petit pétreux.
3. Le nerf stapédien (nerf du muscle de l'étrier) : Naît de la partie mastoïdienne du nerf.
4. Le corde du tympan : il naît au-dessus du foramen stylo-mastoïdien, remonte dans le canal facial, puis dans le canal de la corde du tympan creusé dans la paroi postérieure de la caisse du tympan.



5. Le rameau auriculaire (rameau sensitif du conduit auditif) : Il naît au niveau du foramen stylo-mastoïdien, contourne le bord antérieur de la mastoïde, traverse la paroi cartilagineuse du méat acoustique externe pour innervier les téguments du méat acoustique externe, de l'auricule et de la face externe du tympan.

#### B- BRANCHES EXTRA-PETREUSES :

1. Le nerf auriculaire postérieur : pour les muscles auriculaire supérieur, auriculaire postérieur et occipital.
2. Le rameau digastrique : pour les le muscle ventre-postérieur du digastrique.
3. Rameau stylo-thyroïdien : pour le muscle stylo-thyroïdien.
4. Les rameaux communicant avec le IX et avec le X.



## **V- BRANCHES TERMINALES :**

### **A- BRANCHE TEMPORO-FACIALE :**

Elle se porte en avant, s'anastomose avec l'auriculo-temporal, se divise en plusieurs rameaux pour les muscles peauciers situés au-dessus de la bouche. Ces rameaux cheminent entre les deux lobes de la parotide, unis par le plexus parotidien. Ils en sortent au bord supérieur et antérieur de la glande. Ce sont:

1. • les rameaux temporaux pour l'auriculaire antérieur, le frontal antérieur;
2. • les rameaux frontaux pour le sourcilier, le pyramidal, et le frontal;
3. • les rameaux palpébraux pour l'orbiculaire des paupières;
4. les rameaux sous-orbitaires pour le grand et le petit zygomatiques, le canin, l'élévateur de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, le transverse, le myrtiliforme, le dilatateur des narines;
5. • les rameaux buccaux supérieurs pour le buccinateur et la moitié supérieure de l'orbiculaire des lèvres.



*Le nerf Facial Pr Amrane CY*

### B- BRANCHE CERVICO-FACIALE :

Verticale, elle descend entre les deux lobes de la parotide et se divise au niveau de l'angle de la mâchoire. Ce sont: ~

- 1• les rameaux buccaux inférieurs pour le risorius et la moitié inférieure de l'orbiculaire des lèvres;
- 2• les rameaux mentonniers pour le triangulaire des lèvres, le carré du menton, la houppe du menton;
- 3 •- le rameau cervical pour le peaucier du cou ou le muscle platysma

