

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
 Université de Constantine 3
 Faculté de médecine CHU de Constantine
 Laboratoire d'Anatomie
 Cours pour étudiants de deuxième année de médecine

Le nerf Vague

Pr Boukabache Leila

I- Introduction

Le nerf vague (pneumogastrique) est le Xème nerf crânien. C'est un nerf **mixte** somatique et **viscéral**.

Son territoire s'étend de la tête à l'abdomen.

Son territoire sensitif : partie de la peau du conduit auditif externe.

Son territoire moteur : muscles du pharynx, du voile du palais et du larynx.

Son Territoire végétatif : cou (trachée, œsophage, gros vaisseaux), thorax (bronches, cœur, poumons, gros vaisseaux), abdomen (estomac, foie et intestin) il est riche en neurofibres parasympathiques, il prend part à la constitution de tous les plexus viscéraux, à l'exception du plexus hypogastrique.

II- Anatomie descriptive

1- Origine réelle

Noyaux du tronc cérébral

Noyau dorsal du X (végétatif)

Noyau Ambigu (moteur)

Noyau du faisceau solitaire (sensitif)

2- Origine apparente

Il émerge du sillon collatéral postérieur de la moelle allongée entre le IX en haut et le XI en bas.

3- Trajet et rapports

Le nerf vague traverse :

- **la fosse crânienne postérieure** : il a un trajet horizontal

- **le foramen jugulaire** : il traverse sa partie moyenne accompagné du XI et l'artère méningée postérieure. Il présente à ce niveau son ganglion supérieur.

- **l'espace latéro-pharyngien** : Il présente son ganglion inférieur (ganglion plexiforme) il descend dans la gaine carotidienne le long de l'angle d'écartement postérieur de l'artère carotide interne et la veine jugulaire interne.

- **Traverse l'orifice supérieur du thorax**

- **Dans le thorax : il est**

❑ **Dans le médiastin supérieur** : Le X droit est derrière le plan veineux fait de la veine brachio-céphalique droite et la veine cave supérieure. Le X gauche est derrière la veine brachio-céphalique gauche

❑ **Dans le médiastin postérieur** : Le X droit s'étale sur la face postérieure de l'œsophage. Le X gauche s'étale sur la face antérieure de l'œsophage, ils forment le plexus œsophagien.

❑ **Dans le hiatus œsophagien** : Ils traversent le hiatus, le X droit sur la face postérieure de l'œsophage et le X gauche sur la face antérieure de l'œsophage.

4- Terminaison

Dans l'abdomen

Le **X droit** est sur la face postérieure du cardia il donne 4 à 5 branches pour la face postérieure de l'estomac. Il se termine dans le plexus cœliaque.

Le **X gauche** est sur le bord droit du cardia, passe sur la petite courbure de l'estomac où il se termine en donnant des branches gastriques et des branches hépatiques

III- Branches collatérales

Branches cervicales

1- rameau méningé

2- rameau auriculaire

Nerf vague

- 3- rameaux pharyngiens
- 4- le nerf du sinus carotidien
- 5- rameaux cardiaques supérieurs
- 6- nerf laryngé supérieur
- 7- nerf laryngé récurrent droit

Branches thoraciques

- 1- rameaux cardiaques inférieurs
- 2- nerf récurrent laryngé gauche
- 3- rameaux pulmonaires
- 4- rameaux œsophagiens

Branches abdominales

Le X droit donne des rameaux gastriques pour la face postérieure de l'estomac.

Le X gauche donne des rameaux gastriques pour la face antérieure de l'estomac.

III- Branches terminales

Le **X gauche** : il se termine en donnant :

- 1- le nerf principal antérieur de la petite courbure qui se termine devant le pylore
- 2- le nerf gastro-hépatique qui chemine dans le petit omentum et se termine en 3 ou 4 rameaux hépatiques.

Le **X droit** : Il se termine dans les ganglions coeliaques.

IV- Les anastomoses

- Avec le nerf facial
- Avec le glossopharyngien par une grêle anastomose qui va au ganglion inférieur du IX
- Avec le spinal : la branche médiale du XI va au ganglion plexiforme.
- Avec le sympathique

Intérêt clinique :

- La paralysie bilatérale du nerf vague entraîne la dysphagie (difficulté à avaler).
- La paralysie unilatérale du nerf vague et du glossopharyngien entraîne une déviation de l'uvule palatine (signe du rideau).
- La paralysie unilatérale du nerf laryngé récurrent donne une voix bitonale, aigue.
- La paralysie bilatérale du nerf laryngé récurrent donne une voix étouffée, voilée, rauque.

Référence

Kamina P Tête et cou nerfs crâniens et organes des sens tome 2 éd. Maloine Paris 2002

Lazorthes G le système nerveux périphérique éd. Masson Paris 1971

Illustrations : Anatomie des nerfs crâniens Dr. Bertrand Boutillier Pr. Gérard Outrequin

