

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
 Université de Constantine 3
 Faculté de médecine CHU de Constantine
 Laboratoire d'Anatomie
 Cours pour étudiants de deuxième année de médecine

Le nerf glosso-pharyngien

Elaboré par le Pr BOUKABACHE Leila

I- Introduction

Le nerf glosso-pharyngien (IXème nerf crânien) est un nerf mixte assurant plusieurs fonctions

- motrice : temps pharyngien de la déglutition (oropharynx)
- sensitive : la muqueuse du pharynx, de l'oreille moyenne, du tiers postérieur de la langue
- sensorielle : gustation (tiers postérieur de la face dorsale de la langue).
- neuro-végétative : sécrétion de la glande parotide et régulation de la tension artérielle grâce au nerf du sinus carotidien.

II- Anatomie descriptive

1- origine apparente

Il naît du sillon dorso-latéral de la moelle allongée (bulbe rachidien) au-dessus du nerf vague (X)

2- trajet

Il est dans :

- la fosse cérébrale postérieure
- il quitte le crâne en traversant la partie antérieure du foramen jugulaire, où il présente ses deux ganglions supérieur et inférieur.
- il est dans l'espace latéro-pharyngien.

3- terminaison

Il se termine en rameaux linguaux pour la partie postérieure du dos de la langue.

II- Rapports

a- dans la fosse crânienne postérieure : il se dirige en avant et latéralement, il répond :

- En haut aux nerfs vestibulo-cochléaire (VIII) et facial
- En bas au nerf hypoglosse
- En arrière aux nerfs vague et accessoire (XI)

b- dans le foramen jugulaire : il traverse la partie antérieure du foramen,

Le foramen jugulaire est cloisonné par des formations fibreuses : deux ligaments jugulaires en trois compartiments

- le compartiment antérieur : dans lequel se voit le nerf IX avec le sinus pétreux inférieur
- le compartiment moyen : dans lequel se voient les nerfs X et XI avec l'artère méningée postérieure.
- le compartiment postérieur ; dans lequel se voit la veine jugulaire interne.

c- dans l'espace latéro-pharyngien

Le nerf est d'abord dans l'espace rétro-stylien où il est en dedans puis en avant de la veine jugulaire interne. L'artère carotide interne est située médialement.

Le IX passe ensuite dans la région para-tonsillaire où il répond

- Latéralement au muscle styloglosse qui le sépare du nerf lingual
- Médialement aux muscles stylo-pharyngien et le muscle constricteur supérieur du pharynx qui le sépare de la tonsille palatine

Nerf glosso-pharyngien

- Il passe entre le constricteur supérieur et moyen du pharynx pour atteindre la langue.

III- Branches collatérales

1- le nerf tympanique (nerf de Jacobson)

Il naît du ganglion inférieur et monte dans la cavité tympanique, il donne des branches pour :

- la muqueuse de la fenêtre vestibulaire,
- la muqueuse de la fenêtre cochléaire,
- la muqueuse de la trompe auditive ;
- il donne le nerf petit pétreux, qui va vers le ganglion otique,
- le nerf grand pétreux et les nerfs carotico-tympaniques.

2- le rameau communicant avec nerf facial

3- le nerf du sinus carotidien : il gagne le sinus carotidien

4- les rameaux pharyngiens ; pour la muqueuse pharyngienne et le muscle constricteur supérieur du pharynx.

5- le nerf du muscle stylo-pharyngien

6- le nerf du muscle styloglosse

7- les rameaux tonsillaires : pour la tonsille palatine (amygdale palatine)

IV- Branches terminales

Rameaux linguaux pour la partie postérieure de la langue en arrière du V lingual.

V- Anastomose

Avec le nerf trijumeau dans la langue, avec le VII par le nerf petit pétreux, et avec le X et le sympathique.

VI- Lésions du IX

L'atteinte du IX se traduit soit par des névralgies, soit par des signes déficitaires


- 1- La névralgie est caractérisée par des douleurs paroxystiques situées dans la région amygdalienne et la trompe auditive irradiant vers l'oreille.
- 2- Les signes déficitaires : anesthésie du territoire du nerf c'est-à-dire l'amygdale, le pharynx, la trompe auditive, agnosie gustative du tiers postérieur de la langue et abolition du réflexe nauséux.

Remarque

Agnosie : Trouble de la reconnaissance des informations sensorielles, en l'absence d'anomalie des organes de perception, dû à une lésion du nerf ou du cortex cérébral.

Douleurs paroxystiques : douleurs récidivantes intenses

Nerf glosso-pharyngien




Rapports du IX dans la fosse crânienne postérieure

Nerf glosso-pharyngien

2

③ IX - Le nerf Glosso - pharyngien extra - crânien : Trajet, Rapports et Distribution



Référence

- Kamina P tête et cou nerfs crâniens et organes de sens tome 2 éd. Maloine Paris 1998
- Lazorthes G. Le système nerveux périphérique description, systematization, exploration éd. Masson et Cie 1971
- Illustrations: Anatomie des nerfs crâniens Dr. Bertrand Boutillier Pr. Gérard Outrequin