

- LE NERF ACCESSOIRE (XI ème paire crânienne)
-LE NERF HYPOGLOSSE (XII ème paires crânienne)

1-Le nerf accessoire ou spinal (XI ème paire crânienne)

1-Introduction :

Le nerf accessoire ou spinal est la XIème paire crânienne ,c'est un nerf moteur ,constitué de deux racines crâniale et spinale .

La racine crâniale est destinée à la motricité pharyngée et laryngée, et la racine spinale aux muscles sterno-cléido-mastoïdien et trapèze.

Origine apparente:

La racine crâniale ou bulbaire par 4 à 5 filets qui naissent du sillon collatéral postérieur du bulbe spinal au dessous du vague

La racine spinale ou médullaire : est formé de plusieurs filets qui sortent du cordon latéral de la moelle spinale.

-Origine réelle :

• **Le noyau bulbaire du XI :**

Il est constitué par la partie inférieure du noyau ambigu, pour certain, il naît du noyau dorsal du nerf vague.

• **Le noyau spinal du XI :**

Il est situé dans la partie latérale de la corne ventrale des segments médullaire C1 à C5.

Trajet :La racine spinale monte dans le canal vertébral ,pénètre dans le crâne par le trou occipital et se réunit à la racine crâniale près du foramen jugulaire .

- Dans le foramen jugulaire (le trou déchiré postérieur) :Le tronc du nerf XI est situé dans sa partie moyenne, Il est séparé du bulbe de la veine jugulaire par le ligament jugulaire .

Le nerf accessoire traverse le foramen jugulaire et se divise en sortant de cet orifice en deux branches terminales.

Branches terminales du nerf accessoire :

il se divise en deux branches terminales l'une médiale l'autre latérale.

-La branche médiale se jette dans le nerf vague représente la racine crâniale .


-La branche latérale représente la racine spinale ; traverse le muscle sterno-cléido-mastoïdien et se termine dans le muscle trapèze.

le SCM est aussi innervé par le nerf cervical C2, le trapèze est aussi innervé par les nerfs cervicaux C3 et C4.

Territoire d'innervation :le nerf accessoire est moteur innerve les muscles trapèze et sterno-cléido-mastoïdien.Participe à l'innervation du pharynx et larynx avec le vague .

Nerf accessoire (XI) : schéma

Voir aussi Planche 32



2- Le nerf hypoglosse (XII ème paires crânienne)

INTRODUCTION :

Le nerf hypoglosse (grand hypoglosse) ou XII ème paire crânienne est un nerf exclusivement moteur, destiné à l'innervation des muscles de la langue et les muscles sous hyoïdiens, il joue un rôle important dans la mastication, la succion, la déglutition et la parole.

ANATOMIE DESCRIPTIVE :

Origine apparente : naît au niveau du sillon collatéral antérieur ou pré olivaire du bulbe rachidien par 10 à 12 racines.

-Origine réelle : Le noyau de l'hypoglosse est médial au noyau dorsal du vague (X) sur toute la hauteur du bulbe

TRAJET : Les filets convergent en dehors et s'unissent en un seul tronc qui traverse le canal condylien antérieur et sort du crâne.

Son trajet comprend 6 parties

1- Dans la fosse crânienne postérieure Situées dans l'espace subarachnoïdien, les racines se dirigent latéralement derrière l'artère vertébrale puis elles fusionnent en un tronc qui traverse la dure mère.

2-Traverse le canal condylien antérieur , Il est accompagné de son rameau méningé et d'un rameau méningé de l'artère pharyngienne ascendante.

3-Traverse l'espace retro-stylien (ou latéro-pharyngien) ,

4-puis passe dans la région carotidienne ,

5-traverse la région sub mandibulaire , d'abord sur la face latérale du muscle hyo-glosse, puis chemine entre le muscle mylo-hyoïdien et hyo-glosse,

6-dans la région sublinguale où il se termine.

TERMINAISON : dans la région sublinguale où il se termine..

BRANCHES COLLATERALES :

1°-Rameau méningé ,

2°-Rameau vasculaires :pour la carotide et la jugulaire ,

3°-La branche descendante : se détache du nerf et descend verticalement en avant des gros vaisseaux ,le long de l'angle dièdre formé par l'artère carotide primitive et la veine jugulaire interne ,arrivé au niveau du tendon intermédiaire de l'Omo-hyoïdien il s'anastomose avec la branche descendante du plexus cervical profond et forme ainsi une anse ***c'est l'anse de l'hypoglosse***. De cette anse naissent des rameaux pour les muscles :

-Omo-hyoïdien,- le sterno-cleido-hyoïdien et le sterno-thyroïdien.

4°- Nerf du thyro-hyoïdien ,

5°-Nerf de l'hyoglosse et du stylo-glosse. (le muscle stylo-glosse innervé par le IX ET LE VII)

6°-Nerf du génio-hyoïdien.

BRANCHES TERMINALES :

se divise sur la face externe du génio-glosse en de nombreux rameaux terminaux destinés aux muscles de la langue.

ANASTOMOSES : il s'anastomose avec le vague(X),le sympathique cervical, le nerf lingual et le plexus cervical.

Références /

H Rouviere anatomie humaine descriptive topographique tome 1tête et cou

P Kamina nerfs crâniens et organes des sens

GUY LAZORTHES -LE SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE

Nerf hypoglosse (NC XII) : schéma

