

LES VEINES DU MEMBRE SUPERIEUR

PLAN :

I-INTRODUCTION.

II- RESEAU VEINEUX SUPERFICIEL.

III-RESEAU PROFOND .

I-INTRODUCTION :

Le membre thoracique possède deux réseaux veineux :

- L'un superficiel, sus-aponévrotique ;
- L'autre profond, sous-aponévrotique, collecté par les veines profondes, satellite aux artères, cheminant entre les masses musculaires.

Le réseau profond draine la majeure partie du sang des organes sous-aponévrotiques, celui des organes superficiels (peau, tissu cellulaire, pannicule adipeux plantaire, ganglions lymphatiques) est drainé par la voie superficielle.

Les veines perforantes font communiquer le réseau superficiel au profond et peuvent ainsi se suppléer l'un l'autre.

III-RESEAU PROFOND :

Les veines profondes accompagnent les artères. Elles sont au nombre de deux par artère et portent le même nom que l'artère correspondante. Il existe donc :

- deux veines radiales ;
- deux veines ulnaires ;
- deux veines brachiales ;

Seule l'artère axillaire n'est accompagnée que par un seul tronc veineux, la veine axillaire.

Toutes ses veines ainsi que leurs collatérales sont munies de valvules.

Les veines profondes, satellites des artères, ont la même direction, le même trajet, les mêmes rapports musculaires que les artères correspondantes. Seule l'artère axillaire présente quelques particularités.

▪ VEINE AXILLAIRE :

Large de 1 cm, elle est formée par la réunion des deux veines satellites de l'artère brachiale.

A sa partie inférieure, la veine axillaire est placée sur le côté interne de l'artère axillaire, puis dans son trajet ascendant, elle s'enroule sur l'artère et se place à sa partie supérieure sur le côté antéro-interne.

Elle reçoit, en plus des collatérales correspondantes de l'artère axillaire, la veine céphalique, dans laquelle se jettent les veines acromio-thoraciques.

Souvent, il peut exister un canal collatéral à la veine axillaire, placé en dehors de la veine et en avant de l'artère.

II- RESEAU VEINEUX SUPERFICIEL :

Il est situé dans le tissu cellulaire sous-cutané et comprend :

- les veines superficielles des doigts et de la main ;
- les veines de l'avant-bras ;
- les veines du bras.

1-LES VEINES SUPERFICIELLES DES DOIGTS :

a-réseau dorsal :

- Réseau veineux sous-unguéal (lit unguéal) ;
- Réseau veineux péri-unguéal (racine de l'ongle) ;
- Veines digitales : au nombre de deux ou une seule médiane volumineuse ;
- Arcade digitale : reçoit les veines digitales et se draine dans les veines métacarpiennes.
- les veines métacarpiennes

b- Réseau palmaire des veines des doigts :

Il se déverse dans le réseau dorsal des doigts et de la main par les veines latérales.

2- LES VEINES DE LA MAIN :

a- Les veines dorsales de la main :

- Veines métacarpiennes : cheminent sur la face dorsale des espaces métacarpiens correspondants ;
- L'arcade veineuse dorsale : résulte de l'anastomose entre les veines métacarpiennes. Aux extrémités de cette arcade se jettent également deux veines :
 - la veine céphalique du pouce qui vient de la face externe du pouce ;
 - et la veine salvatelle du 5ème doigt qui vient de la face interne du petit doigt.

b- Les veines palmaire de la main : elles rejoignent le réseau veineux dorsale de la main.

3-AU NIVEAU DE L'AVANT-BRAS :

Les réseaux veineux de la main donnent naissance à trois troncs veineux qui deviennent les troncs collecteurs des veines l'avant-bras :

a-Veine céphalique anté-brachiale (veine radiale superficielle) : elle provient de la céphalique du pouce et de l'arcade veineuse dorsale ; croise la tabatière anatomique, monte sur le bord latéral de l'avant-bras et se termine au milieu du pli du coude en se divisant en deux branches :

- La branche interne, ou veine médiane basilique, chemine le long du sillon bicipital médial ;
- La branche externe, ou veine médiane céphalique, monte en haut et en dehors le long du sillon bicipital latéral.

b-Veine basilique anté-brachiale (veine ulnaire superficielle) : elle naît de l'union de la veine salvatelle du 5ème doigt et de l'extrémité interne de l'arcade veineuse dorsale ; elle monte sur le bord médial de la face antérieure de l'avant-bras et se réunit, au-dessus et en dehors de l'épicondyle médial à la veine médiane basilique. De la réunion de ces deux veines naît la veine basilique.

c -Veine médiane antébrachiale (veine médiane de l'avant-bras): elle naît au niveau du réseau veineux palmaire de la main, du pli de flexion du poignet, elle monte le long de la partie moyenne et antérieure de l'avant-bras et se termine le plus souvent, dans la veine médiane basilique.

4-AU NIVEAU DU PLI DU COUDE : Disposition classique en M veineux du pli du coude.

Constitution :

- les deux veines médiane basilique et médiane céphalique au milieu ;
- les deux veines radiale superficielle et ulnaire superficielle, latéralement.

5- AU NIVEAU DU BRAS :

La face antérieure du bras est parcourue par les veines basilique et céphalique.

-Veine céphalique brachiale : Née de l'union de la veine médiane céphalique et de la veine céphalique antébrachiale ; chemine le long du bord externe du biceps, dans le sillon delto-pectoral pour se jeter dans la veine axillaire.

-Veine basilique brachiale : Née de l'union de la veine basilique antébrachiale et la veine médiane basilique, monte le long du bord interne du biceps, traverse le fascia au milieu du bras pour se jeter dans la veine brachiale.







