

# Nerf axillaire

## PLAN :

- I. Introduction.
- II. Anatomie descriptive.
  1. Origine.
  2. Trajet.
  3. Terminaison.
- III. Rapports.
- IV. Branches collatérales.
- V. Branches terminales.
- VI. Territoire d'innervation.
- VII. Anatomie clinique

## I. Introduction :

Le nerf axillaire ou nerf circonflexe est un nerf mixte, sensitivo-moteur, branche terminale du plexus brachial.

C'est le nerf du moignon de l'épaule, abducteur de l'épaule.

## II. Anatomie descriptive :

### 1. Origine :

Il naît du faisceau postérieur (tronc secondaire postérieur) du plexus brachial, dans le creux axillaire, derrière le muscle petit pectoral, ses fibres proviennent des branches antérieures des nerfs spinaux C6- C7.

### 2. Trajet :

Il se porte en dehors et en arrière, traverse l'espace axillaire latéral (huméro-tricipital), cravate le col chirurgical de l'humérus, puis se termine dans le muscle deltoïde.

### 3. Terminaison :

Il se termine à la face profonde du deltoïde.

## III. Rapports :

### 1. Dans le creux axillaire :

Il est sur la face antérieure du muscle subscapulaire.

### 2. Au niveau de l'espace axillaire latéral : il est accompagné par l'artère circonflexe postérieure.

Cet espace est limité :

- En haut : muscle petit rond.
- En bas : muscle grand rond.
- Médialement : long triceps.
- Latéralement : col chirurgical de l'humérus.

#### IV. Branches collatérales :

1. Rameaux articulaires : pour l'articulation scapulo-humérale.
2. Rameaux moteurs : petit-rond.
3. Rameau sensitif : rameau cutané du deltoïde.

#### V. Branches terminales :

Le nerf se termine en rameaux qui abordent la face profonde du muscle deltoïde.

#### VI. Territoire d'innervation :

1. Motrice : muscles ; deltoïde et petit rond, il est donc abducteur et rotateur latéral du bras.
2. Sensitive : face latérale de l'épaule.

#### VII. Anatomie clinique :

Le nerf axillaire peut-être atteint lors de luxation de l'épaule, ou les fractures du col chirurgical de l'humérus.

L'atteinte du nerf axillaire donne une paralysie du muscle deltoïde qui se traduit par l'impossibilité de porter le bras en avant ou en arrière, il s'y associe une perte de la sensibilité du moignon de l'épaule.

#### Bibliographie :

Hammoudi SS. Le cours d'anatomie.fasc.2 appareil locomoteur membre inférieur. ISBN 2008.

Kamina P. Précis d'anatomie clinique. Tome I. Edition Maloine Paris 2022. France.

J. BRIZON et J. CASTAING, les feuillets d'anatomie, vaisseaux du membre supérieur, fascicule VI, Edition MALOINE.




Figure 01 : vue dorsale de l'épaule




Figure 02 : territoire sensitif du nerf axillaire