

Questions à choix simple (30 QCS)

Q1. Chez la femme :

- A. L'ovocyte, dans un follicule de De Graaf, est bloqué en métaphase.
- B. La membrane de Slavjansky sépare la granulosa de la thèque externe.
- C. La FSH, agissant seule, peut provoquer la croissance folliculaire.
- D. Le cycle menstruel est caractérisé par 04 phases cycliques qui se succèdent.
- E. La phase de multiplication ne se déroule pas exclusivement pendant la vie fœtale.

Q2. Concernant la spermatogénèse :

- A. Les spermatogonies A1 se divisent pour donner chacune, 2 spermatocytes I.
- B. 02 spermatozoïdes dérivent d'une même spermatide.
- C. Les spermatogonies A2 sont les véritables cellules souches.
- D. Les spermatogonies B se divisent au bout de 09 jours.
- E. 04 spermatozoïdes sont issus d'une même spermatogonie B.

Q3. L'appareil génital masculin comporte de chaque côté :

- A. Deux testicules, coiffés par l'épididyme et logés dans le scrotum.
- B. Un canal efférent, qui prolonge le canal déférent.
- C. Un canal éjaculateur, qui fait suite à l'épididyme.
- D. Un épididyme, qui prolonge le canal déférent
- E. Un canal déférent, qui prolonge l'épididyme.

Q4. Chez l'homme, selon quel ordre chronologique, le spermatozoïde subit-il les modifications ?

- A. Mobilité -Capacitation -Décapacitation -Réaction acrosomiale.
- B. Capacitation -Réaction acrosomiale -Décapacitation -Mobilité.
- C. Mobilité -Décapacitation -Capacitation -Réaction acrosomiale.
- D. Décapacitation -Mobilité -Réaction acrosomiale -Capacitation.
- E. Réaction acrosomiale -Capacitation -Mobilité -Décapacitation.

Q5. Concernant la phase de différenciation lors de la spermatogénèse :

- A. Elle précède la spermiation
- B. L'acrosome est un petit lysosome situé au pôle antérieur du futur spermatozoïde.
- C. Les mitochondries se disposent en spirale autour de la portion moyenne de l'axonème
- D. Les modifications nucléaires commencent vers le fin de la spermiogénèse
- E. Le cytoplasme excédentaire est entièrement phagocyté par les cellules de Sertoli.

Q6. Quelle proposition exacte mentionne l'état chromosomique de la spermatide ?

- A. 2n chromosomes bichromatidiens
- B. 2n chromosomes monochromatidiens
- C. n chromosomes bichromatidiens
- D. n chromosomes monochromatidiens
- E. 2n chromosomes, 1q ADN

Q7. Concernant l'étude des paramètres spermatiques :

- A. Le sperme peut adopter un aspect gris opalescent, indiquant une infection.
- B. Le spermocytogramme constitue à lui seul, l'examen clé de l'exploration de la fertilité masculine.
- C. L'étude de la viscosité fait partie de l'examen macroscopique du sperme.
- D. L'hyperspermie peut être due à un hypogonadisme.
- E. Les spermatozoïdes sont agités mais non-progressifs lorsque la motilité est de type (b).

Q8. Chez la femme et concernant l'appareil génital :

- A. La muqueuse utérine est la partie la plus interne de la paroi utérine.
- B. L'endomètre est composé d'un épithélium de revêtement simple cubique et d'un chorion sous-jacent, séparés par une lame basale.
- C. Le chorion de la paroi utérine est un tissu conjonctif lâche, relativement riche en fibres et peu vascularisé.
- D. Les glandes utérines, tubuleuses ramifiées, apparaissent comme des évaginations de l'épithélium de revêtement.
- E. la zone fonctionnelle, contenant les glandes, est la plus épaisse, au contact du myomètre.

Q9. Concernant la folliculogénèse, quelle est la proposition juste englobant les trois séries de données ?

- | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 1. Phase de croissance basale | a. Follicule antral $\Rightarrow$ follicule mur | μ . 191 jours |
| 2. Phase de quiescence | b. Follicule primordial $\Rightarrow$ follicule primaire | β . 14 jours |
| 3. Phase de croissance terminale | c. Follicule primaire $\Rightarrow$ follicule antral | Ω . Mal connu |
- A. (1, a, μ) B. (2, b, Ω) C. (3, c, β) D. (1, b, β) E. (2, b, μ)

Q10. Quelle est la proposition n'ayant aucune relation avec le phénomène de la lutéinisation?

- A. Lipochrome B. Progestérone C. Phase folliculinaire
D. Corpus luteum E. Cellules para lutéiniques

Q11. Quelle est la proposition présentant l'ordre chronologique des phénomènes observés lors de la première semaine du développement embryonnaire?

1. Fusion membranaire, 2. Caryogamie, 3. Réaction corticale, 4. Réaction acrosomiale
A. (1,2,3,4) B. (1,3,2,4) C. (4,2,1,3) D. (4,3,1,2) E. (4,1,3,2)

Q12. Le CD9, un des cofacteurs intervenant dans le contrôle du processus de fusion membranaire, reconnaît sur le spermatozoïde:

- A. Une molécule de la super famille des immunoglobulines B. Une intégrine
C. Une molécule de la super famille des tetraspanines
D. Une phospholipase E. Une Galtase

Q13. Quel phénomène observe-t-on lors de la fécondation ?

- A. Compaction B. Eclosion C. Expansion D. Segmentation E. Plasmogamie

Q14. Le passage de la membrane pellucide est spécifique de l'espèce grâce à la reconnaissance entre :

- A. ZP1 et GalTase B. ZP3 et Strypsyne C. ZP2 et Fertiline
D. ZP3 et GalTase E. ZP3 et E-Cadhérine

Q15. La réaction acrosomiale s'effectue entre :

- A. Membrane plasmique et membrane externe de l'acrosome.
B. Membrane plasmique et membrane interne de l'acrosome.
C. Les deux membranes interne et externe de l'acrosome.
D. Membrane plasmique et membrane nucléaire.
E. Membrane externe de l'acrosome et membrane nucléaire.

Q16. Concernant le stade Morula :

- A. Le terme désigne la masse cellulaire pleine formée après 2 ou 3 divisions successives.
B. Il s'observe entre le 3^{ème} et le 4^{ème} jour.
C. L'œuf est entouré de la membrane pellucide et sa taille augmente.
D. Les cellules externes sont plus grandes. E. La surface de l'œuf est rugueuse.

Q17. La figure X représenterait une coupe au niveau d'?

- A. Un tube séminifère.
- B. Une villosité primaire
- C. Un blastocyste
- D. Une morula
- E. Un ovocyte II

Figure X



Q18. Ordonnez les phases de l'implantation en choisissant la réponse juste ?

- | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1. Invasion | 2. Apposition | 3. Précontact | 4. Adhésion | |
| A. (1,2,3,4) | B. (3,2,1,4) | C. (3,4,2,1) | D. (2,1,4,3) | E. (3,2,4,1) |

Q19. La structure qui participe à la formation du placenta, interposée entre l'embryon et le myomètre au pôle embryonnaire est appelée caduque :

- A. Réfléchie
- B. Ovulaire
- C. Basale
- D. Vraie
- E. Pariétale

Q20. Parmi ces propositions, quelle est la cavité qui apparaît à la 2^{ème} semaine du développement embryonnaire et persiste jusqu'à l'accouchement ?

- A. Cavité amniotique
- B. Lécitocèle I
- C. Lécitocèle II
- D. Blatocèle
- E. Coelome extra-embryonnaire

Q21. Concernant la figure Y :

- A. Il s'agit d'un embryon âgé de 12 jours.
- B. La structure 1 représente la splanchnopleure extra-embryonnaire.
- C. La cavité amniotique est représenté par le chiffre 2.
- D. La structure 4 représente l'allantoïde.
- E. La structure 3 représente le coelome intra-embryonnaire.




Figure Y

Q22. Le processus chordal suit un ordre précis, lequel ?

- | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. Canal | 2. Gouttière | 3. Plaque |
| 4. Prolongement céphalique | 5. Chorde | |
| A. (1,2,3,4,5) | B. (2,5,1,3,4) | C. (4,1,2,3,5) |
| D. (4,1,3,2,5) | E. (4,2,1,3,5) | |

Q23. Le mésoblaste issu de la ligne primitive est à l'origine de plusieurs structures, sauf le:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Mésoblaste intermédiaire | B. Mésoblaste latéral | C. Mésoblaste axial |
| D. Mésoblaste para-axial | E. Aucune réponse | |


Q24. Le mésoblaste n'est pas à l'origine:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| A. De la zone angiogène | B. Des ilots de Wolf et Pander |
| C. Des gonocytes primordiaux | D. De la zone cardiogène |
| E. De la membrane pharyngienne | |

Q25. Parmi les légendes de la figure Z , quelle est la réponse juste?

- | | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. Tube neural, | 2. Canal chordal, | 3. Mésoblaste latéral, | 4. Cavité amniotique, | 5. Lécitocèle I |
| A. (1,4) | | | | |
| B. (2,3) | | | | |
| C. (1,2) | | | | |
| D. (1,5) | | | | |
| E. (3,4) | | | | |

Figure Z



Q26. Concernant l'organisation du placenta, la figure β mentionne le stade:

- A. Chorion avilleux, fruste lacunaire
- B. Chorion trabéculaire
- C. Chorion vilieux diffus
- D. Chorion diffus, chorion touffu
- E. Placenta et chorion lisse.




Figure β

Q27. Une structure disparaît peu à peu de la paroi de la barrière placentaire augmentant l'échange entre vaisseaux maternels et foetaux, il s'agit de la (du) :

- A. Plaque basale
- B. Cytotrophoblaste
- C. Plaque chorale
- D. Syncytiotrophoblaste
- E. Mésenchyme

Q28. Concernant les conséquences des grossesses gémellaires sur le développement foetal:

- A. Les grossesses dizygotiques dichoriales ont le taux de prématurité le plus élevé.
- B. Le retard de croissance intra-utérine est la première cause de mortalité périnatale et de morbidité.
- C. Le jumeau acardiaque est une malformation observée le plus souvent chez les jumeaux monochoriaux biamniotiques.
- D. Le cas dit « foetus in foetu » concerne les monstres doubles autosites.
- E. On considère que l'hypotrophie d'un des jumeaux est grave lorsque le plus petit a un poids de naissance inférieur de 15 % du poids de naissance du plus gros.

Q29. Parmi les méthodes contraceptives :

- A. La pilule combinée protège contre les maladies sexuellement transmissibles.
- B. Plus l'indice de Pearl est faible, meilleure est la méthode de contraception.
- C. La vasectomie chez l'homme consiste en la ligature des canaux efférents.
- D. La pilule d'urgence est une pilule contenant un oestroprogestatif.
- E. La méthode de contraception dite « MAMA » est basée sur l'inhibition de la sécrétion de la prolactine.

Q30. Concernant la thérapie cellulaire, Les cellules mésenchymateuses sont des cellules souches :

- A. Unipotentes
- B. Totipotentes
- C. Multipotentes
- D. Pluripotentes
- E. Pluripotentes induites



Département de Médecine de Constantine - Epreuve d'Embryologie -A1-C1-

Nom:

Prénom:

Salle/Place / Date de naissance: / /
Matricule

CORRIGE TYPE EM

Ce sujet contient 30 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (☒ ou ☒)

A B C D E

1. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

2. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

4. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

5. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

6. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

7. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

8. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

9. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

10. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

A B C D E

11. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

12. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

13. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

14. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

15. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

16. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

17. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

18. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

19. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

20. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

A B C D E

21. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

22. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

23. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

24. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

25. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

A B C D E

26. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

27. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

28. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

29. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

30. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐