

CONTROLE D'HISTOLOGIE

1^{ère} année de médecine

Durée 1heure

Année universitaire 2022/2023

Cochez la réponse juste :

1/le tissu cartilagineux est d'origine :

a- entoblastique b- neuréctoblastique c- mésenchymateuse d- ectoblastique e- épiblastique

2/ l'un des éléments suivants n'appartient pas au tissu cartilagineux, lequel ?

a- substance fondamentale b- fibres de collagène c- fibres élastiques d- chondrocytes e- ostéoblastes

3/le tissu le moins répandu dans l'organisme est le tissu :

a- musculaire b- osseux c- nerveux d- sanguin e- cartilagineux

4/le cartilage hyalin contient :

a- fibres de collagène+substance fondamentale b- fibres élastiques

c- substance fondamentale+fibres élastiques d- fibres de collagène denses e- fibres de réticuline

5/la fibre musculaire striée *squelettique*

a- est dite léiomyocyte b- est une cellule fusiforme allongée c- a un noyau unique central

d- a des filaments homogènes non striés e- a des noyaux multiples périphériques

6/les cellules myoépithéliales sont :

a- localisées dans la tunique moyenne de l'aorte b- localisées dans les glandes salivaires

c- localisées dans l'appareil juxta-glomérulaire d- les cellules de Ruyters e- des cellules glandulaires

7/le sarcomère est fait :

a- de la strie M, un demi disque A, un disque I, un demi disque A et la strie M b- seuls les filaments fins sont présents dans la bande H

c- la strie Z, un demi disque I, un disque A, un demi disque I et la strie Z

d- seuls les filaments épais sont présents dans le disque I e- la strie M et renflement médian du disque I

8/l'une des propositions ne caractérise pas l'ostéoclaste ?

a- cellule volumineuse b- immobile c- cellule ostéorésorbante d- pourvue d'une bordure en brosse

e- plurinucléée

9/quelle est la proposition qui ne correspond pas au tissu osseux non lamellaire ?

a- les lamelles osseuses sont irrégulières b- les ostéocytes sont situés entre les lamelles

c- orientation irrégulière des fibres collagène d- un grand nombre d'ostéocytes dispersés e- minéralisation moins forte

10/le périoste :

a- tapisse les parois des cavités vascularisées des os b- sa couche externe contient les fibres de Sharpey

c- tapisse les surfaces articulaires d- organisé en 3 couches

e- sa couche externe contient les cellules ostéoprogénitrices

11/au niveau d'un hémogramme normal, le nombre par mm³ de sang, des globules rouges est de :

a- 200 000 à 400 000 b- 5000 à 9000 c- 4,5 à 5 millions d- 45 à 50 millions e- 1 à 2 millions

12/l'hématocrite est :

a- est le volume occupé par les globules blancs par rapport au volume global du sang

b- est le volume occupé par les plaquettes par rapport au volume global du sang c- son taux est de 90%

d- est le rapport entre le volume occupé par les globules et le volume sanguin total e- son taux est de 75%

13/le mésenchyme est un tissu conjonctif embryonnaire composé de :

a- fibroblastes b- cellules indifférenciées c- cellules épithéliales

d- cellules provenant des crêtes neurales e- substance fondamentale riche en fibres

14/la fibronéctine est une glycoprotéine de structure qui :

- a- assure la rétention d'eau au niveau de la substance fondamentale
- b-facilite la diffusion des métabolites
- c-facilite la migration des cellules du tissu conjonctif et aux fibres collagène
- d- permet l'adhésion des cellules entre elles
- e-rend la matrice extracellulaire plus rigide

15/quel est le type cellulaire qui ne synthétise pas le collagène ?

- a-chondroblastes
- b- fibroblastes
- c- ostéoblastes
- d-macrophages
- e- odontoblastes

16/tous ces constituants caractérisent le tissu conjonctif non spécialisé sauf un, lequel ?

- a-fibres conjonctives
- b- cellules non jointives
- c-substance fondamentale amorphe
- d-vaisseaux sanguins
- e- substance fondamentale minéralisable

17/l'épithélium cylindrique stratifié est retrouvé au niveau de :

- a-canaux excréteurs des glandes sudoripares
- b- urètre de l'homme
- c-estomac
- d-canal déférent
- e-canaux biliaires

18/ la trompe de Fallope est tapissée par un épithélium :

- a-cubique stratifié
- b- pavimenteux simple
- c- cylindrique stratifié
- d- prismatique simple cilié
- e-polymorphe

19/l'endothélium est un épithélium :

- a-kératinisé
- b- recouvre le péritoine
- c- de transition
- d- fait de cellules cylindriques
- e-pavimenteux simple

20/dans les épithéliums revêtement, l'endoblaste est à l'origine de :

- a-système nerveux
- b-muscle et cartilage
- c-appareil génital
- d-peau
- e-appareil pulmonaire

21/ au niveau de l'épiderme, les cellules à épines sont de forme :

- a-pavimenteuse
- b- polygonale
- c- sphérique
- d- pyramidale
- e-cubique

22/l'épithélium malpighien non kératinisé est retrouvé au niveau :

- 1-cavité buccale
- 2-rein
- 3-vessie
- 4-intestin
- 5-œsophage
- a- 2-3
- b- 1-4
- c- 3-5
- d- 1-5
- e- 1-2

23/les épendymocytes forment un épithélium :

- a-prismatique simple cilié
- b-cubique simple
- c-pavimenteux simple
- d-polymorphe
- e-pseudo-stratifié

24/la névroglie périphérique comporte des :

- a-épendymocytes
- b-oligodendrocytes
- c-cellules de Schwann
- d-astrocytes
- e-microgliocytes

25/les neurones des ganglions rachidiens sont des neurones :

- a-sensitifs
- b-végétatifs
- c-moteurs
- d-sensoriels
- e-sécrétoires

26/les cellules ganglionnaires du système sympathique sont des neurones :

- a-végétatifs
- b-sensitifs
- c-sécrétoires
- d-moteurs
- e-sensoriels

27/à propos de l'origine embryologique de l'épithélium glandulaire :

- a-l'épithélium glandulaire se forme par invagination dans l'ectoblaste sous jacent
- b-l'épithélium glandulaire se forme à partir d'un épithélium secondaire
- c-l'épithélium glandulaire se forme à partir d'un cordon vide
- d-la glande est dite exocrine si l'épithélium perd le contact avec l'épithélium primitif
- e-la glande est dite endocrine si l'épithélium perd le contact avec l'épithélium primitif

28/le cycle sécrétoire de la glande comporte la phase de :

- a-sécrétion
- b-mise en charge succédant l'extrusion
- c-extrusion continue
- d-remodelage
- e-renouvellement

29/dans l'excrétion holocrine :

- a-la cellule ne parcourt qu'un seul cycle sécrétoire
- b-elle ne se charge que d'une petite quantité limitée de produit de sécrétion
- c-le produit glandulaire est constitué par l'ensemble de la cellule qui est partiellement excrétée
- d-la glande parotide est une glande holocrine
- e-le produit de sécrétion est accumulé au pôle apical et se détache lors de l'extrusion

30/lequel de ces tissus conjonctif comporte surtout des fibres de collagène, peu de cellules conjonctives, très peu de fibres élastiques, une substance fondamentale peu abondante et des fibres enchevêtrées ?

- a-tissu adipeux
- b-tissu conjonctif dense orienté
- c-tissu conjonctif dense non orienté
- d-tissu conjonctif lâche
- e-tissu muqueux



Département de Médecine de Constantine - Epreuve d'Hystologie - A1-C1-

Nom:

Answer: TVDE

Prénom:

			C	O	R	I	N	E			H	E				
--	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	--	--

Salle/Place

[illegible]

Date de naissance

Ce sujet contient 30 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (☒ ou ☒)

A B C D E

1. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

2. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

4. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

5. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

6. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

7. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

8. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

9. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

10. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

A B C D E

11. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

12. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

13. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

14. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

15. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

16. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

17. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

18. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

19. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

20 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

A B C D E

21. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

22. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

23. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

24. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

25 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐