


Les muscles de la cuisse:

Muscle	Origin	Terminaison	Action	Innervation
Groupe musculaire antérieur				
<u>Plan profond:</u> Muscle quadriceps fémoral	- muscle vaste intermédiaire (crural) : faces antérieure et postéro-latérale du fémur. - muscle vaste médial (vaste interne) : ligne âpre du fémur sur la lèvre médiale et la ligne spirale. - muscle vaste latéral (vaste externe) : Il s'insère sur la crête rugueuse qui limite en dedans et en bas de la face antérieure du grand trochanter et sur la lèvre latérale de la ligne âpre. - muscle droit fémoral (droit antérieur) : par 03 tendons. ⌘ Tendon direct : sur l'épine iliaque antéro-inférieure. ⌘ Réfléchi : sur le sillon supra-acétabulaire. ⌘ Récurrent : sur la ligne intertrochantérique.	sur la base de la patella par le tendon quadricipital qui se prolonge au-dessous de la patella par le tendon patellaire ce dernier se termine sur la tubérosité tibiale.	extenseur de la jambe sur la cuisse, Le muscle droit fémoral est fléchisseur de la cuisse sur le bassin.	nerf fémoral (plexus lombaire)
<u>Plan profond:</u> Muscle articulaire du genou	sur la face antérieure du fémur au-dessous du vaste intermédiaire.	Sur la bourse séreuse supra-patellaire ou bourse séreuse sous quadricipitale.	élève la bourse séreuse.	le nerf fémoral (plexus lombaire).
<u>Plan superficiel:</u> Muscle Sartorius	sur l'épine iliaque antéro-supérieure.	Sur la partie supérieure de la face médiale du tibia, il forme avec les muscles graciles et semi-tendineux, les muscles de la patte d'oie.	fléchisseur de la jambe sur la cuisse et la cuisse sur le bassin	le nerf fémoral (plexus lombaire)

Schéma



Groupe musculaire médiale

Plan profond:
Muscle grand adducteur

Il s'insère sur la branche ischio-pubienne et la face postérieure de la tubérosité ischiatique.

⌘ Le faisceau supérieur : il se termine sur la branche latérale de trifurcation de la ligne âpre (versant médial) et la partie supérieure de la lèvre latérale de la ligne âpre.
⌘ Le faisceau moyen : il s'insère sur l'interstice de la ligne âpre.
⌘ Le faisceau inférieur : il s'insère sur le tubercule de l'adducteur, également par des fibres récurrentes sur la branche médiale de bifurcation de la ligne âpre formant le hiatus de l'adducteur (anneau du troisième adducteur)

adducteur et rotateur latéral de la cuisse.

pour le faisceau supérieur et moyen : nerf obturateur (plexus lombaire), pour le faisceau inférieur : nerf sciatique (plexus sacré).

Plan moyen:
Muscle court

il s'insère sur la lame quadrilatère du pubis et la partie supérieure de la


se termine en deux faisceaux.
⌘ Le faisceau supérieur se termine sur

adducteur et fléchisseur de la

le nerf obturateur (plexus lombaire).

adducteur	branche ischio-pubienne	la crête située en dehors de la branche moyenne de trifurcation de la ligne âpre. ⌘ Le faisceau inférieur se termine sur l'interstice de la partie supérieure de la ligne âpre.	cuisse.	
<u>Plan superficiel:</u> Muscle long adducteur	sur l'angle du pubis et la face inférieure du tubercule du pubis.	sur l'interstice de la partie moyenne de la ligne âpre	adducteur et fléchisseur de la cuisse.	nerf obturateur (plexus lombaire)
<u>Plan superficiel:</u> Muscle pectiné	sur le pecten ou la crête pectinéale, la lèvre antérieure du sillon obturateur.	sur la ligne pectinée ou crête pectinéale.	adducteur et fléchisseur de la cuisse.	nerf fémoral.
<u>Plan superficiel:</u> Muscle gracile (droit interne)	Il s'insère sur la lame quadrilatère du pubis et le long de la symphyse.	sur la partie supérieure de la face médiale du tibia (champ des muscles de la patte d'oie).	et rotateur médial de la jambe et adducteur de la cuisse.	nerf obturateur.

Schéma



Groupe musculaire postérieur

<u>Plan profond:</u> Muscle semi-membraneux	il s'insère sur la tubérosité ischiatique	son tendon terminal se divise en trois parties : ⌘ Le tendon direct qui se termine sur la tubérosité médiale du tibia (face postérieure) ⌘ Le tendon réfléchi qui se termine sur la tubérosité médiale du tibia (face antérieure) ⌘ Le tendon poplité oblique ou récurrent qui se termine sur la coque condylienne latérale	fléchisseur de la jambe sur la cuisse puis fléchisseur de la cuisse sur le bassin et rotateur interne de la jambe.	nerf tibial (Plexus sacral).
<u>Plan superficiel:</u> Muscle semi-tendineux	la tubérosité ischiatique, par un tendon commun avec le chef long du biceps.	par un tendon qui passe en arrière du condyle du fémur et se termine à la partie supérieure de la face médiale du tibia (insertion de la patte d'oie)	fléchisseur de la jambe sur la cuisse puis fléchisseur de la cuisse sur le bassin et rotateur interne de la jambe.	nerf tibial (plexus sacral)
<u>Plan superficiel:</u> Muscle biceps fémoral	⌘ Le chef long naît de la tubérosité ischiatique. ⌘ Le chef court naît de la lèvre latérale de la ligne âpre du fémur	par un tendon commun sur l'épiphyse proximale de la fibula.	extenseur de la hanche, fléchisseur du genou.	⌘ Chef long : branche du nerf sciatique. ⌘ Chef court : branche du nerf fibulaire commun.

Schéma

