

LES MUSCLES DU MEMBRE PEVIEN

Dr.BOUZIDI ESMA
Laboratoire d'Anatomie Générale
CHUC

INTRODUCTION

Les muscles du membre inférieur se répartissent en:

- **Muscles du bassin**
- **Muscles de la région glutéale**
- **Muscles de la cuisse**
- **Muscles de la jambe**
- **Muscles du pied**




ROLE

Ces muscles assurent:

- La stabilité de la posture
- La locomotion




I. MUSCLE DU BASSIN



Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
Muscle Grand Psoas	• Face latérale des corps vertébraux de T12 à L5. • Processus costiformes (lombaires)	Petit trochanter	- Fléchisseur - rotateur latéral de la cuisse	Rameau du Plexus lombaire
Muscle Iliaque	Fosse iliaque	//	//	Nerf Fémoral



Muscle INCONSTANT	Origine	Terminaison	Action	Innervation
Muscle petit psoas	Face latérale des corps vertébraux de T12 et L1.	Ligne arquée de l'os iliaque	Fléchisseur accessoire du bassin	Rameau du Plexus lombaire




II. MUSCLES DE LA REGION GLUTEALE

Se répartissent en 2 groupes musculaires:


- ❑ 1- Le groupe des muscles glutéaux et tenseur du fascia lata (4)
- ❑ 2- Le groupe des muscles pelvi- trochantériens (6).

1-Groupe des muscles glutéaux et tenseur du fascia lata


Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
1- Muscle Petit glutéal	Surface glutéale de la face latérale de l'ilium	bord antérieur du grand trochanter	Abducteur de la cuisse	<u>Nerf glutéal sup</u> (plexus sacral)
2- Muscle Moyen glutéal		Face latérale du grand trochanter	Abducteur de la cuisse	<u>Nerf glutéal sup</u> (plexus sacral)
3- Muscle Grand glutéal	Surface glutéale, sacrum et coccyx	-superf-: sur tractus ilio-tibial -prof-: sur Tubérosité glutéale du fémur	•Extenseur et Rotateur latéral de la cuisse	<u>Nerf glutéal inf</u> (plexus sacral)



Muscle petit glutéal



Muscle moyen glutéal



Muscle grand glutéal

Muscle	Origine	Terminaison
4- Muscle Tenseur du fascia lata	• Épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) • Crête iliaque.	• tubérosité latérale du tibia.

Action	Innervation
• Tenseur du tractus ilio-tibial • Extenseur de la jambe • Abducteur et rotateur médial de la cuisse.	<u>Nerf glutéal sup</u> (plexus sacral)




2-Le groupe des muscles pelvi-trochantériens

Muscle	Origine	Terminaison	Action
1- Muscle Piriforme	S2 , S3 et S4.	face sup du grand trochanter.	• Rotateur latéral de la cuisse • Abducteur de la cuisse
2- Muscle Obturateur interne	face médiale du foramen obturé et membrane obturatrice interne	sur la face médiale du grand trochanter.	Rotateur latéral de la cuisse


Innervation

Nerf du pyramidal
(plexus sacral)


Nerf de l'obturateur interne et du jumeau- sup
(Plexus sacral)




Muscle	Origine	Terminaison	Action	INNERVATION
3- 4 - Muscle jumeaux sup et inférieur	• JUM SUP: épine ischiatique. • JUM INF: tubérosité ischiatique	sur le tendon de l'obturateur interne.	Rotateur latéral de la cuisse	JUM.SUP: Nerf de l'obturateur interne et du jumeau supérieur JUM.INF: Nerf du jumeau inférieur et du carré fémoral





Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
5- Muscle Obturateur externe	Face latérale du foramen obturé et la membrane obturatrice externe.	face médiale du grand trochanter.	Rotateur latéral de la cuisse	<u>rameau du nerf obturateur</u> (plexus lombaire)
6- Muscle Carré fémoral	Face latérale de la tubérosité ischiatique.	bord postérieur du grand trochanter et crête intertrochantérique	• Rotateur latéral de la cuisse • Adducteur de la cuisse	<u>nerf du jumeau inf. et du carré fémoral</u> (plexus sacral)



MUSCLES DE LA CUISSE




- La cuisse est divisée en **2 loges** musculaires par les septums intermusculaires fémoraux médial et latéral
- Ses muscles se répartissent en **3 groupes** musculaires:
- **La loge fémorale antérieure**: comprend le groupe musculaire **antérieur**.
- **La loge fémorale postérieure**: comprend les groupes musculaires **médial** et **postérieur**.




LOGE ANTERIEURE: groupe antérieur

Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
Muscle Quadriceps fémoral	Os coxal et Fémur	-Tendon du quadriceps (sur la base de la patella) - et tendon patellaire(sur la tubérosité tibiale)	•Extenseur de la jambe pour les 04 portions. • Fléchisseur de la cuisse sur le bassin, pour le droit fémoral.	<u>Nerf fémoral</u> (plexus lombaire)


Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
Muscle Droit fémoral	• Tendon direct: sur l'épine iliaque antéro-inférieure • Tendon réfléchi: sur le sillon supra- acétabulaire. • Tendon récurrent: ligne intertrochantérique	Tendon du quadriceps et tendon patellaire	.Extenseur de la jambe . Fléchisseur de la cuisse sur le bassin	<u>Nerf fémoral</u> (plexus lombaire)
Muscle Vaste médial	lèvre médiale de la ligne âpre	//	Extenseur de la jambe	//
Muscle Vaste latéral	lèvre latérale de la ligne âpre	//	Extenseur de la jambe	//
Muscle Vaste intermédiaire	faces antérieure et postéro-latérale du fémur	//	Extenseur de la jambe	//



Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
Muscle Sartorius	EIAS .	partie supérieur de la face médiale du tibia.	Fléchisseur de la jambe sur la cuisse et de la cuisse sur le bassin	<u>Nerf musculo-cutané externe</u> = (plexus lombaire)




Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
Muscle Articulaire du genou	Face antérieure du fémur au dessous du vaste intermédiaire	Bourse séreuse supra-patellaire	Élève la bourse séreuse	<u>Nerf Fémoral</u> (plexus lombaire)




LOGE POSTERIEURE: groupe médial

Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
Muscle Grand Adducteur	branche ischio-pubienne et tubérosité ischiatique.	par 3 faisceaux (sup/moy/inf) sur la ligne âpre.	Adducteur et rotateur latéral de la cuisse.	• <u>Nerf obturateur</u> (plexus lombaire) pour les faisceaux sup et moy. • <u>Nerf sciatique</u> (plexus sacré) pour le faisceau inf
Muscle Court Adducteur	Lame quadrilatère du pubis.	2 faisceaux : ligne âpre.	Adducteur et fléchisseur de la cuisse.	<u>Nerf obturateur</u> (plexus lombaire).
Muscle Long Adducteur	Angle du pubis	ligne âpre	//	//





Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
Muscle Pectiné (1)	pubis	branche moyenne de la ligne âpre.	Adducteur et fléchisseur de la cuisse	<u>Nef du pectiné</u> (branche du nerf fémoral)
Muscle Gracile (2)	symphyse pubienne	partie supérieure de la face médiale du tibia.	• Fléchisseur et rotateur médial de la jambe. • Adducteur de la cuisse	<u>Nerf obturateur</u> (plexus lombaire)




LOGE POSTERIEURE: groupe postérieur

Muscle	Muscle Semi-membraneux	Muscle Semi-tendineux
Origine	Tubérosité ischiatique	
Terminaison	3 tendons: direct, réfléchi et récurrent	Face médiale du tibia
Action	• Fléchisseur de la jambe sur la cuisse, puis de la cuisse sur le tronc. • Rotateur médial de la jambe	
Innervation	<u>Nerf du semi-membraneux</u> (plexus sacré)	<u>Nerf du semi-tendineux</u> (plexus sacré)



Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
Muscle Biceps fémoral	• Chef court: lèvre latérale ligne âpre. • Chef long: tubérosité ischiatique	face supérieure tête fibula	• Fléchisseur de la jambe, puis extenseur de la cuisse sur le bassin. • Rotateur lat- de la jambe.	<u>Nerf sciatique</u> :chef long Nerf fibulaire commun:chef court (plexus sacré)



REMARQUE

Les muscles de **la patte d'oie** = 3 muscles avec une terminaison commune au niveau de la partie proximale de la face médiale du tibia:

- ❑ **Sartorius** : (antérieur).
- ❑ **Gracile** : (médial).
- ❑ **Semi tendineux** : (postérieur).




MUSCLES DE LA JAMBE

La jambe est divisée en **3 loges**
musculaires par les 2 septum
intermusculaires :

antérieur




et postérieur.




LOGE ANTERIEURE

Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
Muscle Tibial antérieur	• Tubercule infracondylaire lat-du tibia (de Gerdy). • Crête oblique et face latérale du tibia.	1er cunéiforme et M1	fléchisseur, adducteur et rotateur médial du pied	<u>Nerf fibulaire profond</u> (plexus sacré)
Muscle Long extenseur de l'hallux	• Face médiale de la fibula. • Membrane interosseuse.	•P1 et P2 de l'hallux.	Extenseur de P2 sur P1 et P1 sur M1 et fléchisseur du pied sur jambe	//



Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
Muscle Long extenseur des orteils	• Condyle latéral du tibia. • Face médiale de la fibula. • Membrane interosseuse crurale	4 tendons destinés aux 4 derniers orteils (P2 et P3)	• Extenseurs des orteils • Fléchisseur et rotateur latéral du pied	<u>Nerf fibulaire profond</u> (plexus sacré)
3^{ème} Fibulaire	• Face médiale de la fibula.	M5	• Fléchisseur et abducteur du pied.	//




LOGE LATÉRALE

Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
Muscle Court fibulaire	• Face latérale de la fibula & Septums intermusculaires	• M5. • Expansion pour M4	abducteur et rotateur latéral du pied	<u>Nef fibulaire superficiel</u> (plexus sacré)
Muscle Long fibulaire	• Condyle latéral du tibia. • Tête et face lat- de la fibula.	M1 ,Expansion pour le 1er cuneiforme	• Extenseur du pied. • abducteur et rotateur lat- du pied	//




LOGE POSTERIEURE : groupe profond


Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
Muscle Poplité	condyle latéral du fémur	Surface poplitée (face post tibia)	Fléchisseur et rotateur médial de la jambe	<u>Nerf tibial</u> (plexus sacré)
Muscle Long fléchisseur des orteils	Face postérieure du tibia	4 tendons sur P3 des 4 derniers orteils	Fléchisseur des orteils et Extenseur du pied.	//



Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
Muscle Tibial postérieur	• Face postérieure du tibia. • Face médiale de la fibula et MIO	• Os naviculaire • Expansions sur les 3 cunéiformes , sur M2, M3 et M4	Adducteur et rotateur médial du pied	<u>Nerf tibial</u> (plexus sacré)
Muscle Long fléchisseur de l'hallux	Face postérieur de la fibula et MIO.	P2 de l'hallux	Fléchisseur de P2 sur P1 puis P1 sur M1	//




LOGE POSTERIEURE : groupe superficiel



Muscles de la face postérieure de la jambe .

MUSCLE TRICEPS SURAL	Muscle Soléaire	Muscle Gastrocnémiens Médial et Latéral
Origine	• Chef fibulaire: tête et face postérieure de la fibula. • Chef tibial: ligne oblique de la face postérieure et bord médial du tibia.	Sur les tubercules supra-condylaires médial et latéral du fémur
Terminaison	Sur le calcaneus par le tendon calcaneen (tendon d'Achille) commun aux 3 portions.	
Action	• Extension du pied. • Fléchisseur de la jambe sur la cuisse. • Adducteur et rotateur médial du pied	
Innervation	Nerf tibial (plexus sacré)	

Muscle	Origine	Terminaison	Action	Innervation
Muscle Plantaire	Surface poplitée du condyle lat- du fémur	Calcanéus	très faible, auxiliaire du triceps sural	<u>Nerf tibial</u> (plexus sacré)




MUSCLES DU PIED



❑ Région dorsale

❑ Région plantaire: avec 3 loges : moyenne(I),médiale(II) et latérale(III).



Coupe frontale de l'avant pied(vue postérieure)

Muscles de la région dorsale:

Muscle court extenseur
Des orteils




Muscle court extenseur
de l'hallux



Muscles de la région plantaire


❑ *Loge moyenne :*

- Muscles interosseux (dorsaux et plantaires)
- Muscles lombricaux
- Muscle carré plantaire
- Muscle court fléchisseur des orteils



❑ Loge médiale :

- Muscle court fléchisseur de l'hallux.
- Muscle adducteur de l'hallux
- Muscle abducteur de l'hallux



❑ Loge latérale:

- Muscle court fléchisseur du petit orteil.
- muscle opposant du petit orteil
- Muscle abducteur du petit orteil

